

脉;内稃几等长于外稃,顶端截平,脊上微粗糙或具纤毛;雄蕊3,花药线形。颖果卵形至长圆形。

模式种:平滑獐毛(拟) *A. laevis* Trin. = *A. lagopoides* (L.) Trin. ex Thwaites

本属含20余种,分布于地中海区域、小亚细亚、喜马拉雅和北部亚洲。我国有4种、1变种。

分种检索表

1. 花序分枝排列紧密而重叠;外稃通常无毛。
 2. 叶片宽3—6毫米,小穗长4—6毫米……………1. 獐毛 *A. sinensis* (Debeaux) Tzvel.
 2. 叶片宽1—2毫米,小穗长2—4毫米……………2. 微药獐毛 *A. micrantherus* Tzvel.
1. 花序分枝排列较疏离;外稃多少有毛。
 2. 颖片及稃片仅脊及边缘有纤毛。
 3. 叶片无毛;颖片及稃片边缘蜜生长纤毛……………3a. 小獐毛 *A. pungens* var. *pungens*
 3. 叶片上面密生糙毛,下面疏生柔毛;颖片及稃片边缘近无毛或仅生数纤毛……………
……………3b. 刺叶獐毛 *A. pungens* var. *hirtulus* S. L. Chen et H. L. Yang
 2. 颖片及稃片全体密生柔毛;叶鞘及叶片两面均密被毛……………
……………4. 毛叶獐毛 *A. pilosus* (X. L. Yang) S. L. Chen et X. L. Yang

1. 獐毛(种子植物名称) 图版2:1—6

Aeluropus sinensis (Debeaux) Tzvel. Pl. As. Centr. 4:128. 1968. — *Aeluropus littoralis* var. *sinensis* Debeaux in Acta Soc. Linn. Bordeaux 33:50. 1879; Forbes et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 36:421. 1904; Kitag. Lin. Mansh. 58. 1939; 中国主要植物图说 禾本科 329. 图 269. 1959; 华东禾本科植物志 96. 1962; 中国高等植物图鉴 5:126. 图 7082. 1976; 江苏植物志(上册): 182. 图 302. 1977.

多年生。通常有长匍匐枝,秆高15—35厘米,径1.5—2毫米,具多节,节上多少有柔毛。叶鞘通常长于节间或上部者可短于节间,鞘口常有柔毛,其余部分常无毛或近基部有柔毛;叶舌截平,长约0.5毫米;叶片无毛,通常扁平,长3—6厘米,宽3—6毫米。圆锥花序穗形,其上分枝密接而重叠,长2—5厘米,宽0.5—1.5厘米;小穗长4—6毫米,有4—6小花,颖及外稃均无毛,或仅背脊粗糙,第一颖长约2毫米,第二颖长约3毫米,第一外稃长约3.5毫米。

产东北、河北、山东、江苏诸省沿海一带以及河南、山西、甘肃、宁夏、内蒙古、新疆等省区;生于海岸边至海拔3200米的内陆盐碱地。模式标本采自天津。

为沿海一带优良固沙植物。

2. 微药獐毛(拟) 密穗小獐毛(新疆植物检索表)

Aeluropus micrantherus Tzvel. Pl. As. Centr. 4:128. 1968. — *Aeluropus littoralis* auct. non Parl.: Norlindh, Fl. Mong. Steppe 1:93. 1949.

多年生。秆斜升，基部多分枝，高 6—30 厘米。叶鞘无毛或疏被柔毛，鞘口或连同边缘被较长柔毛；叶舌膜质，长约 0.2 毫米，顶端覆以长 0.3—0.5 毫米的柔毛；叶片扁平或先端内卷呈针状，长 1.5—4.5 厘米，宽 1—2 毫米，两面密被微刺毛。圆锥花序穗状，长 2—5 厘米，宽约 3 毫米，其上分枝单生，紧贴穗轴而彼此密接且重叠；小穗卵形，长 2—3 毫米，含 2—6 小花；颖卵形，第一颖长 1—1.2 毫米，第二颖长 1.5—1.8 毫米，脊上粗糙，边缘膜质；外稃卵形或宽卵形，具 5—9 脉，边缘膜质，全部无毛或近基部两侧有纤毛，先端锐尖或具极短芒尖，第一外稃长约 2.5 毫米；内稃与外稃近等长；花药长约 0.6—0.8 毫米。

产新疆；生于河岸边、沙地和沙丘间以及平原戈壁和山区。分布于蒙古及苏联的中亚地区。

3. 小獐毛(禾本科图说)

Aeluropus pungens (M. Bieb.) C. Koch in *Linnaea* **21**:408. 1848; Tzvel. Pl. As. Centr. **4**:129. 1968 et in Fed. Poac. URSS **621**. 1976. — *Poa pungens* M. Bieb. Beschreib. Land. Zwisch. Fluss. Terek. u. Kur, **130**. 1800. — *Aeluropus littoralis* subsp. *pungens* (M. Bieb.) Tzvel. Новости Сист. Высш. Раст. **8**:78. 1971. — *Aeluropus littoralis* auct. non Parl.: 中国主要植物图说 禾本科 **328**. 图 **268**. 1959; 中国高等植物图鉴 **5**: **126**. 1976, excl. Pl.; Kitag. Lin. Mansh. **64**. 1979.

3a. 小獐毛(原变种)

var. *pungens*

多年生，具向四周伸展的匍枝。秆直立或倾斜，高 5—25 厘米，花序以下粗糙或被毛，节上通常无毛或可被柔毛，基部密生鳞片状叶，且自基部多分枝。叶鞘多聚于秆基，无毛，长于或短于节间，鞘内有时具分枝；叶舌很短，其上具 1 圈纤毛；叶片狭线形，尖硬，长 0.5—6 厘米，宽约 1.5 毫米，扁平或内卷如针状，无毛。圆锥花序穗状，长 2—7 厘米，宽 3—5 毫米，分枝单生，彼此疏离而不重叠；小穗长 2—4 毫米，含 (2) 4—8 小花，在穗轴上明显排成整齐的 2 行；颖卵形，具膜质边缘，并疏生少量纤毛，脊上粗糙，第一颖长 1—2 毫米，第二颖长 1.5—2.5 毫米；外稃卵形，具 5—9 脉，顶端尖，边缘膜质而具纤毛，尤以基部两侧的毛较长而密，第一外稃长 1.5—3 毫米；内稃等长于外稃，先端截平或具缺刻，脊上具微纤毛；花药长约 1.5 毫米；子房先端无毛，花柱 2，顶生。花果期 5—8 月。

产甘肃及新疆；生于盐碱土及沙地。分布于欧洲、中亚、西部西伯利亚、伊朗、印度等地区。

3b. 刺叶獐毛(变种)(植物研究) 图版 2:7—12

var. *hirtulus* S. L. Chen et X. L. Yang in Bull. Bot. Res. **4**(2):123—124. 1984.

与原变种的主要区别为叶片上面密生刺毛，下面疏生柔毛，颖片的边缘无纤毛或仅有数根纤毛等特征。