

多年生。秆斜升，基部多分枝，高6—30厘米。叶鞘无毛或疏被柔毛，鞘口或连同边缘被较长柔毛；叶舌膜质，长约0.2毫米，顶端覆以长0.3—0.5毫米的柔毛；叶片扁平或先端内卷呈针状，长1.5—4.5厘米，宽1—2毫米，两面密被微刺毛。圆锥花序穗状，长2—5厘米，宽约3毫米，其上分枝单生，紧贴穗轴而彼此密接且重叠；小穗卵形，长2—3毫米，含2—6小花；颖卵形，第一颖长1—1.2毫米，第二颖长1.5—1.8毫米，脊上粗糙，边缘膜质；外稃卵形或宽卵形，具5—9脉，边缘膜质，全部无毛或近基部两侧有纤毛，先端锐尖或具极短芒尖，第一外稃长约2.5毫米；内稃与外稃近等长；花药长约0.6—0.8毫米。

产新疆；生于河岸边、沙地和沙丘间以及平原戈壁和山区。分布于蒙古及苏联的中亚地区。

3. 小獐毛(禾本科图说)

Aeluropus pungens(M. Bieb.) C. Koch in Linnaea **21**:408. 1848; Tzvel. Pl. As. Centr. **4**:129. 1968 et in Fed. Poac. URSS **621**. 1976. — *Poa pungens* M. Bieb. Beschreib. Land. Zwisch. Fluss. Terek. u. Kur, **130**. 1800. — *Aeluropus littoralis* subsp. *pungens* (M. Bieb.) Tzvel. Новости Сист. Высш. Раст. **8**:78. 1971. — *Aeluropus littoralis* auct. non Parl.: 中国主要植物图说 禾本科 **328**. 图 **268**. 1959; 中国高等植物图鉴 **5**: **126**. 1976, excl. Pl.; Kitag. Lin. Mansh. **64**. 1979.

3a. 小獐毛(原变种)

var. *pungens*

多年生，具向四周伸展的匍枝。秆直立或倾斜，高5—25厘米，花序以下粗糙或被毛，节上通常无毛或可被柔毛，基部密生鳞片状叶，且自基部多分枝。叶鞘多聚于秆基，无毛，长于或短于节间，鞘内有时具分枝；叶舌很短，其上具1圈纤毛；叶片狭线形，尖硬，长0.5—6厘米，宽约1.5毫米，扁平或内卷如针状，无毛。圆锥花序穗状，长2—7厘米，宽3—5毫米，分枝单生，彼此疏离而不重叠；小穗长2—4毫米，含(2)4—8小花，在穗轴上明显排成整齐的2行；颖卵形，具膜质边缘，并疏生少量纤毛，脊上粗糙，第一颖长1—2毫米，第二颖长1.5—2.5毫米；外稃卵形，具5—9脉，顶端尖，边缘膜质而具纤毛，尤以基部两侧的毛较长而密，第一外稃长1.5—3毫米；内稃等长于外稃，先端截平或具缺刻，脊上具微纤毛；花药长约1.5毫米；子房先端无毛，花柱2，顶生。花果期5—8月。

产甘肃及新疆；生于盐碱土及沙地。分布于欧洲、中亚、西部西伯利亚、伊朗、印度等地区。

3b. 刺叶獐毛(变种)(植物研究) 图版 **2**:7—12

var. *hirtulus* S. L. Chen et X. L. Yang in Bull. Bot. Res. **4**(2):123—124. 1984.

与原变种的主要区别为叶片上面密生刺毛，下面疏生柔毛，颖片的边缘无纤毛或仅有数根纤毛等特征。