

穗轴 3 棱形, 稃上具短柔毛; 小穗长 1—1.5 毫米; 颖薄纸质, 长约 1 毫米, 具 1 脉; 第 1 颖舟形, 具脊, 第二颖先端具 0.5 毫米的短尖头, 背部粗糙; 第一小花与小穗等长; 外稃薄革质, 卵形, 具 3 脉, 顶端钝, 侧缘内卷, 中脉及边缘具白色短柔毛, 成熟时红棕色; 内稃倒卵形, 顶端圆钝, 具 2 脊, 脊上粗糙; 第二小花仅有退化外稃, 白色纸质, 连同小穗轴共长约 1 毫米。颖果浅棕色, 具 3 棱, 长约 0.7 毫米。 花果期 7—11 月。

产台湾、福建、广东等省; 多生于低海拔开旷草地或灌丛林下。越南、马来西亚及菲律宾均有分布。模式标本采自吕宋岛。

6. 小草属*——*Microchloa* R. Br.

R. Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 208. 1810.

多年生或一年生草本。植株矮小, 密丛生。秆纤细。叶片线形, 常狭窄而内卷, 集生于基部。穗状花序单生于秆顶, 线形, 稍弓曲; 小穗无柄, 甚狭, 背腹压扁, 含 1 小花, 成二列交互着生, 覆瓦状排列于穗轴之一侧; 颖近等长, 顶端尖, 具 1 脉或有时第二颖具 2 脉; 小花短于颖; 外稃质薄, 具 3 脉, 常被毛; 内稃稍短, 脊上有短纤毛, 基盘尖锐; 鳞被截形。染色体 $x = 10$ 。

模式种: 小草 *M. setacea* (Roxb.) R. Br. (*Rottboellia setacea* Roxb.) = *Microchloa indica* (L. f.) Beauv.

约 5 种, 3 种产非洲, 1 种广布全球热带、亚热带干旱环境; 我国产 1 种及 1 变种。

变种检索表

- 植株高 10—25 厘米, 秆直径约 0.5 毫米, 穗状花序长 (3—)5—8(—10) 厘米, 小穗长不逾 3 毫米…… 1a. 小草 *M. indica* var. *indica*
- 1. 植株高 25—60 厘米, 秆直径约 1 毫米, 穗状花序长 (10—)15—20(—25) 厘米, 小穗长可达 4 毫米 …… 1b. 长穗小草 *M. indica* var. *kunthii* (Desv.) B. S. Sun et Z. H. Hu

1. 小草(广州植物名录油印本)

Microchloa indica (L. f.) Beauv. Ess. Agrost. Explic. Planch. 20. 1812; Hand. -Mazz. Symb. Sin. 7:1293. 1936; Merr. et Metc. in Lingnan Sci. Journ. 16:182. 1937; 广州植物志 793. 1956; 中国主要植物图说 禾本科 73. 图 405. 1959; 海南植物志 4: 389. 图 1197. 1977. — *Nardus indica* L. f. Suppl. 105. 1781. — *Microchloa setacea* R. Br. Prodr. 208. 1810; Benth. Fl. Hongk. 428. 1861; Rendle in Journ. Linn. Soc. Bot. 36:492. 1904.

1a. 小草(原变种) 图版 27: 1—5

* 小草属见耿以礼等(1951): 分科检索表附录。