

且等长,稍内卷;雄蕊3枚,花药黄色,细小,长约0.3毫米;花柱2,柱头帚状。颖果卵圆形,棕褐色,长约0.7毫米。染色体数 $2n = 18$ (许建昌, 1975)。 花果期秋季。

产安徽、浙江、江西、福建、台湾、广东、广西、云南;多生于海拔1500米以上的灌丛或草甸中。分布于印度、斯里兰卡、马来西亚、菲律宾、越南、缅甸。模式标本采自马六甲。

2. 小丽草属*——*Coelachne* R. Br.

R. Br. Prodr. Fl. Nov. Holl. 187. 1810.

柔弱的直立或匍匐草本。具短而扁平的披针形叶片和窄狭的圆锥花序。小穗具柄,通常含2小花,均为两性,或第二小花为雌性,小穗脱节于颖之上;两颖几等长,长约为小穗之半,膜质或草质,先端钝,具不明显的1—3(5)脉;外稃纸质或硬纸质,无脉,边缘稍内卷,内稃与外稃同质且等长,边缘亦内卷,背部有凹槽;雄蕊2—3枚;花柱2,分离,柱头帚状。颖果卵状椭圆形。

模式种: 肖丽草(拟) *C. pulchella* R. Br.

本属约4种,分布于非洲、亚洲和大洋洲的热带和亚热带地区。我国现知有1种。

过去有些植物分类学工作者将本属置于燕麦族(Aveneae)中,因其小穗脱节于颖之上之故。1881年 G. Benth 成立柳叶箬族(Isachneae)将本属亦包括在该族中,但 G. Benth 对该族分类界限和范围不够精确。1954年, R. Pilger 在“禾本科的系统”(Das System der Gramineae)一文中,重新加以隶定,该族共包括4属(*Isachne*, *Coelachne*, *Heteranthoecia* et *Limnopoia*)现为多数分类学家所接受。

1. 小丽草(禾本科图说) 图版: 55

Coelachne simpliciuscula (Wight et Arn.) Munro ex Benth. in Journ. Linn. Soc. Bot. 19: 93. 1881; Bor, Grass. Burm.-Ceyl. Ind. Pakist. 576. 1960; 海南植物志 4: 400. 1977. — *Panicum simpliciusculum* Wight et Arn. ex Steud., Syn Pl. Glum. 1: 96. 1854. — *Coelachne pulchella* auct. non R. Br.: Benth. Fl. Hongk. 430. 1861; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 7: 270. 1897; Hitchc. in Lingn. Soc. Journ. 7: 195. 1929; 中国主要植物图说 禾本科 638, 图 575. 1959.

一年生草本。须根细弱。秆纤细,基部有时伏卧地面,并于节处生根,高10—15厘米。叶鞘无毛或上部边缘具微毛,松弛裹茎,无叶舌;叶片柔软,披针形,长1—3厘米,宽2—5毫米,无毛,或沿脉上具短刺毛。圆锥花序窄狭,长3—8厘米,宽5—10毫米,小穗3—7枚着生于穗轴和缩短的分枝上;小穗长2—3毫米,淡绿色或微带紫色;颖草质,具膜质的边缘,第一颖长约1.2毫米,具1—3(5)脉,第二颖长约1.5毫米,具5—7脉;外稃纸质,长2.5—3毫米,内稃与外稃等长,背部有一凹槽;雄蕊3枚,花药长约0.3毫米;花柱2,自子

* 小丽草属见耿以礼等(1951);分科检索表附录。