

1975; 台湾植物志 5: 517. pl. 1417. 1978. — *Isachne monticola* auct. non Buse: Hack. in Bull. Herb. Boiss. ser. 2, 4: 528. 1904; Matsum. et Hayata in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo 22: 499. 1906; S. T. Dunn in Journ. Linn. Soc. Bot. 29: 459. 1911; Honda in Journ. Fac. Sci. Univ. Tokyo sect. 111, Bot. 3: 281. 1930.

一年生。秆细弱，节上易生根，伏卧地面，直立部分高 3—10 厘米。叶鞘短于节间，疏生柔毛，边缘及鞘口具纤毛。叶舌极短，顶端纤毛状；叶片长 1—2 厘米，宽 3—5 毫米，卵状披针形，顶端渐尖，基部钝圆，无明显增厚的软骨质边缘，两面被贴伏的细毛。圆锥花序较紧密，卵圆形，长约 2 厘米，宽约 1 厘米，分枝短，近基部即有分枝和小穗，每一分枝具 2—6 个小穗，花序分枝与小穗柄无腺斑；小穗长约 1.2 毫米，近球形；两颖近等长，顶端钝或骤尖，具 5 脉，中部以上疏生短硬毛；两小花同质同形，长约 1 毫米，均为两性，或第一小花有时为雄性；内外稃均密生短柔毛。颖果椭圆形。染色体数 $2n = 20$ (Hsu, 1975)。
花果期 5—10 月。

产台湾、福建；生于低海拔的湿润草地中。菲律宾亦有分布。据文献记载，福建亦产，但作者未见标本。模式标本采自台湾(淡水)。

4. 瘦瘠柳叶箬(植物分类学报)

Isachne depauperata (Hack.) Merr., Enum. Philip. Fl. Pl. 1: 58. 1922. — *Isachne beneckeii* Hack. var. *depauperata* Hack. ex Merr. in Philip. Journ. Sci. Bot. 1. suppl. 305. 1906; Ohwi in Acta Phytotax. et Geobot. 11: 55. 1942; Keng f. in Acta Phytotax. Sin. 10 (1): 15. 1965. — *Isachne pauciflora* Hack. var. *depauperata* (Hack.) P. Jansen. Reinwardtia 2: 288. 1953.

多年生。植株矮小而柔弱；秆丛生，常于节上生根而匍匐地面，直立部分高仅 2—5 厘米。叶鞘短于节间，疏生柔毛，边缘和鞘口的毛较密；叶舌纤毛状，长约 1 毫米；叶片卵形或长卵形，长 6—10 毫米，宽 3—4 毫米，顶端渐尖，基部心形，边缘不增厚，两面疏生灰白色柔毛。圆锥花序极简单，分枝少，常呈总状排列，每一花序仅有小穗 2—5 枚；小穗柄长于小穗 2—3 倍，无腺斑；小穗椭圆形或倒卵形，长 1.5—1.8 毫米，略带紫褐色；两颖近等长，略长于或近等于小穗，顶端具小尖头，无毛，有不明显的 5—7 脉；两小花同质同形，均为两性；稃体软骨质，无毛；雄蕊 3 枚；花柱 2，柱头帚状，成熟时伸出稃体外。颖果椭圆形，长约 1.2 毫米。 花果期 4—5 月。

产我国台湾。分布于菲律宾。模式标本采自菲律宾。

作者见到标本(台东，大井次三郎 354 号)，其体态细小，匍匐地面，且花序极端简化，不同于本属其他种，故应独立为种。

5. 平颖柳叶箬(禾本科图说)

Isachne truncata A. Camus, Not. Syst. Finet. 2: 205. 1912; 中国主要植物图说 禾本科 641, 图 577. 1959; Keng f. in Acta Phytotax. Sin. 10(1): 13. 1965. —