

米,节上无毛。叶鞘短于节间,边缘及鞘口具纤毛,下部的叶鞘具疣基细刺毛;叶舌纤毛状,长约2毫米;叶片宽披针形,长5—14厘米,宽1—1.8厘米,顶端渐尖,基部钝圆,两面有微小的细毛,稍粗糙,边缘略增厚,呈白色软骨质,其上密生微小的细锯齿。圆锥花序极开展,长达20厘米,宽8—12厘米,分枝细弱而蛇曲,疏生小穗,与小穗柄均具淡黄色腺斑;小穗宽椭圆形或倒卵形,长约2毫米;两颖近等长,淡绿色或略带紫色,具7—9脉,边缘宽膜质,背部中部以上被细小的刺毛;小花淡黄色,第一小花两性,第二小花雌性;鳞被膜质,几呈方形。颖果椭圆形,棕褐色。 花果期9—11月。

产浙江、湖南、广东;生于山坡林荫草地或山谷水旁阴湿处。模式标本采自浙江西天目山。

### 7. 刺毛柳叶箬(植物分类学报)

*Isachne hirsuta* (Hook. f.) Keng f. in Acta Phytotax. Sin. 10 (1): 11. 1965, p. p. excl. specim. K. J. Kuan et B. M. Yang 157 — *Isachne albens* Trin. var. *hirsuta* Hook. f. Fl. Brit. Ind. 7:23. 1897; Bor, Grass. Burm. Ceyl. Ind. Pakist. 579. 1960.

#### 7a. 刺毛柳叶箬(原变种)

##### var. *hirsuta*

多年生。秆直立或倾斜,有时于基部节上生根而伏卧,高35—65厘米,具多节,节上被细柔毛,节上具明显的黄褐色腺斑状环圈。叶鞘短于节间,松弛裹茎,密生疣基细刺毛;叶舌纤毛状,长约3毫米;叶片长卵状披针形,顶端渐尖,基部钝或圆形,边缘软骨质,长10—17厘米,宽1.2—2.5厘米,两面近无毛而稍粗糙。圆锥花序伸出叶鞘外,但基部为叶鞘所包,长约10厘米,宽2—4厘米,每节具1分枝,分枝斜向上举,与小穗柄均无毛,但具黄褐色腺斑,侧生的小穗柄较粗,短于小穗;小穗椭圆形或卵状椭圆形,灰绿色,长约1.8毫米;两颖近相等,略长或稍短于小穗,顶端短尖,具明显的7—9脉,背部上端具疣基小刺毛或无毛;两小花同质同形,均为两性,或有时第一小花为雄性,第二小花为雌性;稃体软骨质,无毛,具不明显的3—5脉;雄蕊3枚,花柱2,柱头棕褐色,帚状,成熟时伸出稃体外。颖果卵圆形,长约1.5毫米。 花果期8—12月。

产福建、广东;生于海拔500—800米的山谷林缘草地中。分布于印度东北部。模式标本采自印度(Wallich no. 8657)。

本种的模式标本仅为植株顶端一枝带叶的花序,因此不能肯定每节之下(接近节处)有无腺斑状环圈,我国所产本种植物除此点外,其余特征均与模式标本一致,故暂定为此种,待资料充足后再行修正。

#### 7b. 永修柳叶箬(变种)(植物分类学报)

var. *yongxiouensis* W. Z. Fang in Acta Phytotax. Sin. 22(4): 308. 1984.

与原变种的区别是,本变种叶片较窄狭,宽0.5—1厘米,上面疏生疣基小刺毛,下面