

密生粉屑状细毛;秆的节下无腺斑状环圈;花序较疏散;小穗椭圆形。

产江西。模式标本采自永修县云居山。

7c. 窄花柳叶箬(变种)(植物分类学报)

var. **angusta** W. Z. Fang in Acta Phytotax. Sin. **22**(4): 308. 1984. — *Isachne hirsuta* (Hook. f.) Keng f. in Acta Phytotax. Sin. **10** (1): 11. 1965, p. p., quoad specim. K. J. Kuan et B. M. Yang 157.

与原变种的区别是,本变种叶片较窄狭,宽约 8 毫米,两面被微小的疣基细毛;秆的节下无腺斑状环圈;花序较小而紧密;小穗卵状披针形,较窄狭。

产湖南。模式标本采自衡山广济寺。

8. 白花柳叶箬(禾本科图说)

Isachne albens Trin. in Sp. Gram. Icon. **1**: pl. 85. 1928; Hook. f. Fl. Brit. Ind. **7**: 22. 1897; Rendle in Journ. Linn. Soc. Bot. **36**: 321. 1904; E. G. Camus et A. Camus in Lecomte, Fl. Gén. L'Indo-Chin. **7**: 417. 1922; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**: 1302. 1936; A. Chase in Journ. Arn. Arb. **24**: 87. 1943; Rhind, Grass. Burm. **44**. 1945; Reeder in Journ. Arn. Arb. **29**: 309. 1948; P. Jansen, Reinwardtia **2**: 279. 1953; 中国主要植物图说 禾本科 640, 图 576. 1959; Bor, Grass. Burm. Ceyl. Ind. Pakist. **579**. 1960; Keng f. in Acta Phytotax. Sin. **10** (1): 10. 1965; 台湾的禾草 465, 图 127. 1975; 台湾植物志 **5**: 516. 1978. — *Panicum albens* (Trin.) Steud. Syn. Pl. Glum. **1**: 96. 1854. — *Panicum zollingeri* Steud. l. c. 96. 1854. — *Isachne stricta* Elmer, Leaflets Philip. Bot. **2**: 463. 1908; A. Chase in Journ. Arn. Arb. **24**: 88. 1923. — *Isachne arisanensis* Hayata, Icon. Pl. Formos. **7**: 57. f. 29. 1918; Honda in Journ. Fac. Sci. Univ. Tokyo sect. 111, Bot. **3**: 278. 1930. — *Isachne elatiuscula* Ohwi in Bot. Mag. Tokyo **56**: 5. 1942.

8a. 白花柳叶箬(原变种)

var. **albens**

多年生。秆坚硬,直立或基部节上生根而倾斜,高 50—100 厘米,基部数节可分枝,无毛。叶鞘除边缘具柔毛外余无毛,短于节间,或上部者稍长于节间,叶舌纤毛状,长约 2 毫米;叶片质较坚硬,披针形,长 7—15 厘米,宽 8—18 毫米,上面具短硬毛而粗糙,下面无毛,边缘加厚而为软骨质。圆锥花序椭圆形或倒卵状椭圆形,开展,长 15—25 厘米,宽 6—12 厘米,分枝单生,每一分枝可再 1—2 次分出小枝,每小枝具 1—2 枚小穗;分枝及小穗柄无腺斑;小穗长 1—1.5 毫米,椭圆状球形,灰白色;颖草质,约与小穗等长,具 5—7 脉,背部上半部疏生小硬毛或无毛;两小花同质同形,内外稃均被微小的细毛,偶有第二小花稍小,为椭圆形或卵圆形,第一小花两性,第二小花常为雌性。颖果椭圆形。染色体数 $2n = 60$ 。花果期夏秋季。