

贴生的疣基细毛。圆锥花序伸出叶鞘外,卵形或椭圆形,长5—8厘米,中部宽3—4厘米,每节具1分枝;分枝斜生或近水平开展,近基部可再分枝而着生小穗;小穗柄长于小穗2—3倍,与分枝均具淡黄色腺斑;小穗绿色或带紫褐色,近圆球形,长约1.2毫米;颖等长或略短于小穗,具3—5脉,中部以上疏生细毛;两小花同质同形,均为卵状球形,长约1毫米,稀第一小花为雄性,第二小花两性;内外稃均密生短茸毛。果未见。花果期9—11月。

产云南;生于海拔约1500米的山坡潮湿草地中。模式标本采自屏边。

11. 小花柳叶箬(拟) 李氏柳叶箬(禾本科图说)

Isachne beneckeii Hack. in Oesterr. Bot. Zeitschr. **51**: 459. 1901; Merr. in Philip. Journ. Sci. Bot. 1. suppl. 350. 1906; E. G. Camus et A. Camus in Lecomte, Fl. Gén. L'Indo-Chin. **7**: 416. 1922; Ohwi in Acta Phytotax. et Geobot. **11**: 54. 1942; 中国主要植物图说 禾本科 642, 图 579. 1959; Keng f. in Acta Phytotax. Sin. **10** (1): 15. 1965; 台湾的禾草 467, 图 128. 1975; 台湾植物志 **5**: 517. 1978.

多年生。须根密而稍粗。秆丛生,质地较坚硬,向上斜升,高15—35厘米,无毛。叶鞘通常短于节间,边缘和鞘口具纤毛;叶舌纤毛状,长约1.5毫米;叶片线状披针形,顶端渐尖,基部圆形,长3—7厘米,宽约5毫米,无毛或粗糙,边缘增厚,软骨质。圆锥花序卵圆形,长8—14厘米,每节通常具1分枝;分枝开展,稍蛇曲,与小穗柄均无腺斑;小穗柄长于小穗2—3倍;小穗宽椭圆形至球形,长约1.5毫米,淡绿色或带暗紫色;两颖近等长,等于或稍短于小穗,顶端钝或圆形,具不明显的5—7脉,通常无毛,稀少具1—2硬毛;两小花同质同形,或第一小花稍狭长,两性;外稃微具细柔毛,或第一小花外稃的毛较少,内稃无毛或仅顶端被微毛;雄蕊3枚,花柱2,柱头帚状。颖果球形,长约1.2毫米。花果期7—11月。

产福建、台湾、云南;生于海拔2000米以下的谷地、溪旁或沟边草丛中。越南、马来西亚、菲律宾、印度尼西亚也有分布。模式标本采自爪哇岛。

本种较稀少。它的小穗较小,与细弱柳叶箬 *I. tenuis* Keng 相似,但后者为一年生,且花序分枝及小穗柄均具腺斑等特征可资区别。

12. 纤毛柳叶箬(禾本科图说)

Isachne ciliatiflora Keng, 中国主要植物图说 禾本科 641, 图 578. 1979, nom. nud.; ex Keng f. in Acta Phytotax. Sin. **10** (1): 13. 1965.

多年生。秆直立,基部常于节上生根而稍膝曲,高30—60厘米,无毛。叶鞘除基部者外均短于节间,除边缘及鞘口具纤毛外,其余无毛;叶舌纤毛状,长约1毫米;叶片线状披针形,长5—15厘米,宽5—10毫米,顶端渐尖,基部圆形,无毛,上面有横脉,边缘全缘,不增厚,微有皱波。圆锥花序伸出叶鞘外,长5—15厘米,每节通常具1分枝,分枝稍蛇曲,上举,与小穗柄均无毛和腺斑;小穗长圆形,长约2.5毫米;两颖近等长,顶端渐尖或急尖,