

稀钝圆,略短于小穗,具5—7脉,无毛,边缘狭膜质;二小花同质同形,均椭圆形,外稃边缘密生纤毛;第一小花长约2.2毫米,两性,第二小花长约2毫米,雌性。颖果椭圆形。花果期6—9月。

产四川;生于1500米以上的山坡、路旁潮湿之地。模式标本采自清溪县。

本种与柳叶箬 (*Isachne globosa* (Thunb.) Kuntze) 相似,但后者花序分枝及小穗柄均有腺斑;小穗略小,小花的外稃边缘无密生的纤毛等特征可资区别。

13. 柳叶箬(植物学大辞典)

Isachne globosa (Thunb.) Kuntze, Rev. Gen. Pl. 2: 778. 1891; Makino in Bot. Mag. Tokyo 26: 214. 1912; Merr. in Lingn. Sci. Journ. 5: 30. 1927; Honda in Journ. Fac. Sci. Univ. Tokyo sect. 111. Bot. 3: 279. 1930; Keng in Nat. Gentr Univ. Sci. Rep. ser. B. Biol. 2(1): 58, pl. 14. 1930; Hitchc. in Lingn. Sci. Journ. 7: 222. 1931; Hand. -Mazz. Sym. Sin. 7: 1302. 1936; Ohwi in Acta Phytotax. et Geobot. 11 (1): 54. 1942; A. Chase in Journ. Arn. Arb. 24 (1): 87. 1943; 广州植物志 802, 图 402. 1956; 中国主要植物图说 禾本科 643, 图 581. 1959, major p. p.; Bor, Grass. Burm. Ceyl. Ind. Pakist. 580. 1960; 华东禾本科植物志 179, 图 115. 1962, Keng f. in Acta Phytotax. Sin. 10(1): 17. 1965; 台湾的禾草 473, 图 131. 1975; 海南植物志 4: 401, 图 1029. 1977; 台湾植物志 5: 519. 1978. — *Milium globosum*. Thunb., Fl. Jap. 49. 1784. — *Panicum muricatum* Retz. Obs. Bot. 4: 18. 1786. — *Isachne australis* R. Br. Prodr. Fl. Nov. Holf. 196. 1810; Benth. Fl. Hongk. 414. 1861; Franch. et Sav. Enum. Pl. Jap. 2: 164. 1879; Hook f. Fl. Brit. Ind. 7: 24. 1897; Diels in Bot. Jahrb. 29: 223. 1900; Rendle in Journ. Linn. Soc. Bot. 36: 321. 1904; E. G. Camus et A. Camus in Lecomte, Fl. Gén. L'Indo-Chin. 7: 410. 1922. — *Panicum lepidorum* Steud. Flora 29: 19. 1846 — *Isachne ponapensis* Hosokawa in Trans. Nat. Hist. Soc. Formos. 24: 200. 1934. — *Isachne globosa* (Thunb.) Kuntze var. *effusa* (Trin. ex Hook. f.) Senarata, Grass Ceyl. 109. 1956. — *Isachne globosa* (Thunb.) Kuntze var. *brevispicula* Ohwi in Acta Phytotax. et Geobot. 11: 54. 1942; Keng f. in Acta Phytotax. Sin. 10 (1): 19. 1965, syn. nov.

13a. 柳叶箬(原变种)

var. *globosa*

多年生。秆丛生,直立或基部节上生根而倾斜,高30—60厘米,节上无毛。叶鞘短于节间,无毛,但一侧边缘的上部或全部具疣基毛;叶舌纤毛状,长1—2毫米;叶片披针形,长3—10厘米,宽3—8毫米,顶端短渐尖,基部钝圆或微心形,两面均具微细毛而粗糙,边缘质地增厚,软骨质,全缘或微波状。圆锥花序卵圆形,长3—11厘米,宽1.5—4厘米,盛开时抽出鞘外,分枝斜升或开展,每一分枝着生1—3小穗,分枝和小穗柄均具黄色腺斑;