

柔毛,边缘粗糙而成波状皱折,近基部边缘被纤毛。圆锥花序由7—9枚总状花序组成;总状花序长2—4厘米,疏离排列于主轴上;主轴及穗轴三棱柱形,具疣基毛;小穗卵状披针形,长4—5毫米,先端渐尖,密生短茸毛,孪生;小穗柄较短,被少数硬疣毛;第一颖广卵形,短小,长为小穗的1/5,先端钝;第二颖等长于小穗,具7—9脉;第一外稃稍短于第二颖,具5—7脉,其内稃短于外稃,有时具雄蕊;第二外稃椭圆形,骨质,背面具微细横皱纹,顶端具长约0.2毫米的小尖头;鳞被2,楔形,折叠,具细脉纹。花果期7—9月。

特产海南;生于密林中。模式标本采自崖县。

3. 长叶尾稃草(云南植物研究)

Urochloa longifolia B. S. Sun et Z. H. Hu in Acta Yunnan 4(2): 140. f. 1. 1982.

3a. 长叶尾稃草(原变种)

var. *longifolia*

多年生草本。秆分枝长,长达1米以上,下部节上生根,节上密被白色短柔毛。叶鞘疏被白色疣基毛;叶舌为一圈长约1毫米的纤毛;叶片线状披针形,长10—11厘米,宽1—1.7厘米,先端长渐尖,基部圆形,两面疏被疣基毛,边缘常呈波状皱折。圆锥花序长约10厘米,由5—11枚总状花序组成;总状花序长3—5厘米,疏离;主轴及穗轴三棱形,疏被长柔毛;小穗卵形或椭圆形,长4.3毫米,无毛,单生;小穗柄长1—1.5毫米,常被数枚白色刚毛;第一颖阔三角形,长约1.5毫米,具3—5脉;第二颖长卵形,与小穗等长,具7脉;第一小花中性或雄性,外稃长卵形,具5脉,内稃膜质,第二小花两性,第二外稃骨质,顶端具长约0.4毫米的小尖头,边缘包着同质的内稃;雄蕊3。颖果卵形,长约2.3毫米。

花果期秋季。

特产云南;生路旁地边,海拔950米。模式标本采自镇康县。

3b. 元谋尾稃草(变种)(云南植物研究)

var. *yuanmiuensis* (B. S. Sun et Z. H. Hu) S. L. Chen et Y. X. Jin in Acta Phytotax. Sin. 22 (6): 472. 1984. — *Urochloa yuanmiuensis* B. S. Sun et Z. H. Hu in Acta Bot. Yunnan 4 (2): 141. f. 2. 1982.

与原变种区别为:叶卵状披针形,长1—7厘米,宽3—12毫米;圆锥花序由3—5枚总状花序组成。

特产云南;生于江边沙滩上,海拔1000米。模式标本采自元谋县。

4. 类黍尾稃草(拟) 图版82: 1—6

Urochloa panicoides Beauv. Ess. Agrost. 53. t. 11. f. 1. 1812; Bor, Grass. Burm. Ceyl. Ind. Pakist. 372. 1960. — *Panicum controversum* Steud. Syn. Pl. Glum. 1: 60. 1854. — *Panicum urochloa* Desv. Opusc. 82. 1831. — *Panicum panicoides* (Beauv.) Hitchc. in Journ. Acad. Sci. Wash. 9: 551. 1919. — *Urochloa*