

28. 类雀稗属*——*Paspalidium* Stapf

Stapf in Prain, Fl. Trop. Afr. 9: 582. 1920.

多年生草本,秆粗壮而倾斜。叶片线形,扁平或内卷。穗状花序交互排列在主轴上而成顶生圆锥花序,紧贴主轴,穗轴略呈三棱形,着生小穗的一面有弯曲的龙骨状突起;小穗椭圆形,背腹压扁,先端急尖,无芒,沿龙骨状突起密集交互排列成2行;小穗含2小花,第1小花雄性或中性,第2小花为两性;第一颖微小,第二颖等长或较短于小穗;第1外稃与第二颖为圆形,内稃存在或缺;第2外稃骨质,背部隆起而对穗轴,先端尖,边缘内卷,包卷同质的内稃;鳞被2;雄蕊3;花柱2,柱头帚刷状,近顶端伸出。颖果平凸。染色体 $x=9$ 。

模式种: 双生类雀稗(拟) *P. geminatum* (Forssk.) Stapf (*Panicum geminatum* Forssk.)

约20种;分布于热带地区,特别是旧大陆分布较广。我国有2种。

分 种 检 索 表

1. 穗状花序短于主轴的节间;第二颖长为小穗的 $2/3$; 第2外稃具细点。..... 1. 类雀稗 *P. flavidum* (Retz.) A. Camus
1. 穗状花序长于主轴的节间;第二颖长为小穗的 $1/3-1/2$; 第2外稃具细皱纹。..... 2. 尖头类雀稗 *P. punctatum* (Brum. f.) A. Camus

1. 类雀稗(禾本科图说) 图版 116

Paspalidium flavidum (Retz.) A. Camus in Lecomte, Fl. Ge'n. L'Indo-chine 7: 419, 1922; 中国主要植物图说 禾本科 719. 图 668, 1959; Bor, Grass. Burm. Ceyl. Ind. Pakist. 333. 1960; 中国高等植物图鉴 5: 176, 图 7182. 1976. — *Panicum flavidum* Retz. Obs. 4: 15, 1786; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 7: 28, 1897; Craib, Contr. Fl. Siam. 31. 1911. — *Panicum floridum* Royle, Ill. Bot. Himal. 420, 1840. — *Panicum granulare* Lam. Tab. Encycl. Meth. Bot. I: 170. 1791.

多年生草本。秆少数丛生或单生,压扁,高30—100厘米。叶鞘光滑,两侧压扁而具脊;叶舌短小,长约0.5毫米;叶片线状披针形,长5—30厘米,宽5—10毫米,先端急尖,基部略呈心形。穗状花序6—9枚,长1.5—2.5厘米,稀疏排列于长达40厘米的主轴上,短于主轴的节间;穗轴延伸为一小尖头;小穗卵形,长1.5—2.5毫米,左右排列在穗轴的一侧,背部隆起,乳白色或稍带紫色;含2小花,仅第2小花结实;第一颖广卵形,先端圆形,长约为小穗之半,具3脉;第二颖略短于小穗,具7脉;第1外稃与小穗等长,具5脉;第2外稃骨质,具细点状;内稃透明膜质,略短于外稃。颖果骨质,椭圆形,腹面平,背面隆起。

花果期7—10月。

* 类雀稗属见耿以礼等(1951): 分科检索表附录。