

芒针粗糙；内稃常缺如；雄蕊3枚，花药紫色，长约0.7毫米；子房长圆形，长约0.2毫米，花柱2，柱头紫色，帚刷状，长约0.2毫米。 花果期9—12月。

产于安徽；多生于山坡草地。模式标本采自安徽省旌德县。

3. 刺叶假金发草（拟） 刺叶金茅（禾本科图说） 图版21：1—7

Pseudopogonatherum setifolium (Nees) A. Camus in Lecomte, Fl. Gen. de L'Indo-Chine. 7: 256. 1922; 海南植物志 4: 455. 1977. — *Pollinia articulata* Trin. subsp. *fragilis* var. *setifolia* Hack. in DC. Monogr. Phan. 6: 153. 1889. — *Pollinia setifolia* Nees in Hook. Kew Journ. Bot. 2: 101. 1850. — *Eulalia setifolia* (Nees) Pilger in Engler u. Prantl, Nat. Pflanzenfam., 14e: 121. 1940; 中国主要植物图说·禾本科 784, 图 730. 1959; 华东禾本科植物志 249, 图 166. 1962.

秆高30—60厘米，光滑无毛。叶鞘无毛，除基部2—3节外均较节间为短；叶舌长约0.5毫米；叶片长5—20厘米，宽1—1.5毫米，通常内卷，上面疏生柔毛，下面无毛。总状花序细弱，带灰白色，长2—4厘米，(1)—2—5枚呈指状排列于秆顶；总状花序轴节间长约2毫米，具白色纤毛，成熟后易逐节断落，脱节处稍偏斜，每节具2同形的小穗，一有柄，另一无柄；小穗棕色，披针形，长2.5—3毫米，基盘具长约为小穗1/5—1/4的短毛；第一颖先端膜质，稍钝，具2微齿，上部具2脊，脊间无脉，背面扁平，下部2/3被白色长柔毛；第二颖舟形，具1脉，先端具长3—6毫米的芒；第一外稃钝头，无毛，长约1毫米；第二外稃极狭，具芒长15—20毫米，芒不明显地二回膝曲，芒柱棕色，扭转而具短柔毛；内稃不存在；雄蕊3枚，花药长约0.7毫米。 花果期9—11月。

产于浙江、江西、福建、广东、广西及云南等省区；多生于山坡和路旁。向南至马来西亚及印度尼西亚也有分布。


15. 拟金茅属* *Eulaliopsis* Honda

Honda in Bot. Mag. Tokyo. 38: 56. 1924. — *Pollinidium* Stapf ex

Haines, Bot. Bihar Orissa, 1020. 1924.

多年生草本植物。秆常直立。叶片狭线形。总状花序排列呈指状或近圆锥状，总状花序轴节间易折断；两小穗同形，成对着生于各节，一无柄，一有柄，基盘密被淡黄色的丝状柔毛，有芒；2颖片在背面中部以下密生长柔毛；第一颖披针形，先端钝，通常有2—3齿，边缘狭窄内折，具5—9脉；第二颖具3—9脉，先端尖或具2齿，由齿间伸出小尖头或芒；外稃透明膜质，第一外稃先端钝，无芒，第二外稃先端全缘或具2齿，有芒；第二内稃宽卵形，无毛或先端具长纤毛；雄蕊3。

* 拟金茅属见耿以礼等《分科检索表附录》。



图版 21 1—7. 刺叶假金发草 *Pseudopogonatherum setifolium* (Nees) A. Camus; 1. 植株下部, 2. 花序, 3. 总状花序轴一节示 1 无柄小穗及 1 有柄小穗, 4. 第一颖背面, 5. 第一颖腹面, 6. 第二颖侧面, 7. 第二外颖及其芒的基部。8—12. 中华笔草 *Pseudopogonatherum contortum* var. *sinense* (Keng ex S. L. Chen) Keng et S. L. Chen; 8. 秆上部及花序, 9. 总状花序轴一节示 2 有柄小穗, 10. 第一颖背、腹面, 11. 第二颖背、腹面, 12. 第二外颖及其芒的基部。(陈荣道绘)