

(3); 294. 1832. — *Ischaemum rugosum* var. *segetum* (Trin.) Hack. in DC. Monogr. Phan. 6: 208. 1889; 中国主要植物图说·禾本科 791. 图 738. 1959; 台湾的禾草 717. 图 254. 1975; 中国高等植物图鉴 5: 190. 1976, in annot.; 台湾植物志 5: 670. 1978.

一年生草本。秆直立丛生，基部斜升，高 60—70 厘米，直径约 2 毫米，质较软，无毛；节上密被髯毛。叶鞘无毛，鞘口具纤毛；叶舌膜质；叶片卵状披针形，长 10—15 厘米，宽约 1 厘米，中脉显著，先端渐尖，基部圆形，两面疏生疣基毛。总状花序孪生于秆顶，互相紧贴，干后常分离，长 8—10 厘米，成熟时麦秆黄色，极易逐节脱落；总状花序轴节间膨胀呈圆锥形，长约 3 毫米，两端稍收缩，外侧边缘具毛，其余无毛；无柄小穗卵形，第一颖长 4.5—5.5 毫米，顶端钝，上部 1/3 具脉纹，下部革质，背面光滑无毛，具 4—5 条横向连贯的深皱纹；基盘具纤毛；第二颖等长于第一颖，舟形，上部具脊；第一小花雄性，卵形，两稃纸质，顶端渐尖，被微毛或粗糙；雄蕊 3；第二小花外稃膜质，长约 3 毫米，顶端 2 深裂至中部，齿间伸出长芒，芒柱长约 6 毫米，芒针长近 10 毫米，膝曲以上仍有扭转。有柄小穗变异甚大，但常退化，小穗柄长约 2.5 毫米，外侧边缘具有纤毛，存留之颖长约 1.2 毫米。 花果期夏秋季。

产于湖南、台湾、广东、广西、云南等省区；多生于田边路旁湿润处。印度、中南半岛及东南亚各国也有分布。

4. 屏东鸭嘴草(台湾植物志)

Ischaemum akonense Honda in Bot. Mag. Tokyo 38: 50. 120. 1923; Hsu in Taiwan 16: 323. 1971; 台湾的禾草 703. 图 247. 1975; 台湾植物志 5: 664. 1978.

秆直立，细弱，高约 40 厘米，节上具短柔毛。叶鞘压扁，边缘具纤毛；叶舌矩圆形，长约 2 毫米，无毛；叶片披针形，基部多少圆形，长约 7 厘米，宽约 7 毫米。总状花序孪生，长 4—6 厘米；总状花序轴节间和小穗柄横截面三角形，膨胀；无柄小穗长约 4 毫米，卵状长圆形，基盘短，具短纤毛；第一颖下部革质，拱起，具 5—6 条横皱纹，上部纸质，歪斜，脉多数，粗糙；第二颖舟形，具脊，脊上有短纤毛；第一小花外稃披针形，透明膜质，具 1 脉；第二小花外稃卵状长圆形，透明膜质，顶端具 2 齿，齿间着生长 10—15 毫米的芒。

我国台湾特有种。分布于台湾南部，多沿灌溉沟渠而生。模式标本采自台湾。

编者未见标本，以上描述根据《台湾植物志》。

5. 细毛鸭嘴草(江苏植物名录) 纤毛鸭嘴草 图版 38: 1—5

Ischaemum indicum (Houtt.) Merr. in Journ. Arn. Arb. 19: 320. 1938; Bor, Grass. Burma Ceyl. Ind. Pakist. 180. 1960; Backer in Fl. Java 3: 592. 1968; H. B. Gill. et al. Fl. Malaya 3: 263. f. 32. col. pl. 20. 1971; 中国高等植物图鉴 5: 190. 图 7209. 1976; 海南植物志 4: 461. 图 1248. 1977; 台湾植物志 5: 668. 图 1472. 1978. — *Phleum indicum* Houtt. in Nat. Hist. II (13): 198. t. 90. f. 2. 1782. — *Ischaemum ciliare* Retz. Obs. Bot. 6: 36. 1791; Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. Bot. 36: 365.