

5—30 厘米或更高,直径 0.5—1 毫米。叶狭如,只在稈的基部有二个叶鞘,长鞘的下部或多或少带紫紅色,上部綠色,薄膜質,鞘口几平,頂端具三角形小齿,高 1.5—4 厘米。小穗披針形或长圓状卵形,少有为球状卵形,长 3—8 毫米,近基部直径 1.5—3 毫米,蒼白色,有密生少数至多数花,少有极多数花,时常从小穗基部生小植株;在小穗基部的一片鱗片中空无花,抱小穗基部一周;其余鱗片全有花,长圓形或近长圓形,頂端鈍或圓,长 2 毫米,寬 1 毫米多,很淡的锈色,中脉一条,淡綠色,邊緣干膜質;下位刚毛 6 条,比小坚果长半倍,不向外展开,锈色,有倒刺,刺密而短;柱头 3。小坚果倒卵形,三稜形,长 1.2 毫米,寬 0.7 毫米,淡黄色或橄欖綠色,各稜具狭边,三面凸起呈膨胀状;花柱基金字塔形,頂端近漸尖,长等于小坚果的 $1/4$,寬等于小坚果的 $1/2$ 。花果期 4—11 月。

除青藏高原、新疆、甘肃等地区外,各省区都有分布;生于水稻田中、水塘和湖边湿地。也見于苏联远东地区、朝鮮、日本、印度、緬甸、中印半島和印度尼西亚等地。

稻田荸荠(变种)

var. **japonica** (Miq.) Tang et Wang, stat. nov. — *Eleocharis japonica* Miq. in Ann. Mus. Bot. Lugd. Batav. II (1865) 142; Kom., Fl. Manshur. I (1901) 351.

稈一般較矮,細若毫发。下位刚毛比小坚果稍短具較稀倒刺。小坚果較短,长 0.8—0.9 毫米。花柱基一般較长。花果期 5—10 月。

产于福建、湖北、云南、江西、四川东部;生于水稻田中和水边。分布于日本和朝鮮。

血紅穗荸荠(变种)

var. **sanguinolenta** Tang et Wang, var. nov.

小穗圓筒形,血紅色,长 8—10 毫米。小坚果較狭,寬 0.5 毫米;花柱基圓錐形,較长,約等于小坚果的一半。

产于貴州?

海綿基荸荠(变种)

var. **spongiosa** Tang et Wang, var. nov.

小穗球状卵形,长 3 毫米。小坚果长 0.9 毫米。花柱基三角形,海綿質。花果期 11 月。

产于江西(萍乡县);生于水塘中。

15. 渐尖穗荸荠

Heleocharis attenuata (Franch. et Savat.) Palla in Monde des plantes XII (1910)