

7. 莎草磚子苗 图版 LIX, 16—17

Mariscus cyperinus Vahl, Enum. (1806) 377; C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. VI (1893) 621, in Journ. Linn. Soc. Bot. XXXVI (1903) 220, in Bull. Acad. Int. Géogr. Bot. XVI (1906) 62 et Ill. Cyp. (1909) t. 22, f. 3—4; Dunn et Tutch. Fl. Kwangt. & Hongk. in Kew Bull. Add. Ser. X (1912) 296; Merr. in Lingn. Sci. Journ. V (1927) 38 — *Mariscus paniceus* Hook. et Arn. Bot. Beech. Voy. (1841) 72, non Vahl. — *Mariscus umbellatus* Vahl var. *cyperinus* E.-G. Camus in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine VII (1912) 77 — *Cyperus cyperinus* (Retz.) Suringar, Het Gesl. Cyp. Mal. Archip. (1898) 154, t. 6, f. 10 (f. *primaria* Suringar) — *Kyllinga cyperina* Retz. Obs. VI (1791) 21 — *Cyperus umbellatus* Benth. Fl. Hongk. (1861) 386, non Burm. neque aliorum — *Cyperus umbellatus* Benth. form. *cyperinus* C. B. Clarke in Journ. Linn. Soc. Bot. XXI (1884) 200 — *Cyperus cyperoides* O. Ktze. subsp. *cyperinus* Kükenth. in Engl. Bot. Jahrb. LIX (1924) 46

var. **cyperinus**

根状茎短。秆散生，稍粗壮，高 15—65 厘米，銳三稜形，平滑，基部具多数叶。叶短于秆，寬 5—7 毫米，下部常折合，向上漸成平张，邊緣粗糙；叶鞘紫紅色。叶状苞片 6—10 枚，长于或稍短于花序，邊緣粗糙；长側枝聚繖花序简单，通常聚縮，具 6—10 个輻射枝；輻射枝短縮或延长，最长达 4.5 厘米；穗状花序寬圓筒形或寬長圓形，基部漸狹，长 12—18 毫米，寬 8—12 毫米，具多数小穗；小穗排列紧密，近于直立或斜展，綫状披針形，长 4—6.5 毫米，寬約 1 毫米，具 2—3 个小坚果；小穗軸具寬翅，翅披針形；鱗片很紧地貼生，紙質，橢圓形，頂端鈍或急尖，无短尖，長約 3.5 毫米，灰綠色或麦秆黃色，具淡褐色短条紋，背面具多条脉，中間 3 条較粗，綠色，稍呈龙骨状突起；雄蕊 3，花药綫形，药隔突出于頂端；花柱中等长，柱头 3。小坚果狭長圓形，三稜形，稍弯，長約为鱗片的 2/3，栗色，具密的微突起細点。 花果期 7—9 月。

产于浙江、广东、海南島、四川；生长于山谷中、緩坡潮湿处或草地上。也分布于印度、緬甸、越南、印度尼西亚、菲律宾、日本琉球羣島以及澳洲。

孟加拉磚子苗(变种)

var. **bengalensis** C. B. Clarke in Hook. f. Fl. Brit. Ind. VI (1893) 621 et Ill. Cyp. (1909) t. 23, f. 1—2 — *Cyperus cyperinus* Suringar var. *bengalensis* (C. B. Clarke) Kükenth. in Engl. Pflanzenr. Heft 101, IV, 20 (1935) 520 — *Mariscus philippensis* C. B. Clarke in Journ. Linn. Soc. Bot. XXXVI (1903) 221, non Steud.

