

組 2. 石果珍珠茅組 Sect. *Lithosperma* C. B. Clarke in Kew Bull. Add. Ser. VIII (1908) 132.

具根状茎。通常为圓錐花序,有时退化成穗状。小坚果平滑;下位盘不发达或呈碟状。

2. 石果珍珠茅 图版 LXV, 8—12

Scleria lithosperma (Linn.) Sw. Prodr. (1788) 18; Benth. Fl. Hongk. (1861) 399; C. B. Clarke in Journ. Linn. Soc. Bot. XXXVI (1903) 265——*Scirpus lithosperma* Linn. Sp. Pl. ed. 1 (1753) 51.

匍匐根状茎短,木质。稈丛生,纤细,三棱形,高 30—50 厘米,直径 1.4—2 毫米,无毛。叶基生和稈生,前者只有鞘而无叶片,后者具长叶片;叶片狭线形,宽 1.5—2 毫米,頂端漸狹成长尾状,边缘具細鋸齿;叶鞘三棱形,閉合,被微柔毛。苞片叶状,具鞘;圓錐花序充分发育者长达 30 多厘米,下部具 1—3 个側生枝花序或无枝花序,上部往往退化为穗状,长 3.5—7 厘米;小穗单生或 2—3 个簇生,长 3—4.5 毫米,具 4—5 鱗片,中有 1—2 朵雄花和 1 朵雌花,雌花生于雄花的下面;鱗片卵状披針形,兩側膜質而有褐色短条紋,背面具龙骨状突起,頂端具短尖;雄蕊不詳。小坚果寬倒卵形或近椭圆形、三棱形或几圓筒状,长 1.5—2.5 毫米,平滑,白色,有光泽,基部狹窄而为三角形,下位盘不发达。花果期 6—10 月。

产于广东及海南島;生长于密林中,海拔 400—1000 米或較低。也分布于印度、錫金、馬來亞、錫兰及非洲。

3. 香港珍珠茅 图版 LXVI, 1—4

Scleria radula Hance in Ann. Sci. Nat. ser. 4. Bot. XVIII (1862) 232; C. B. Clarke in Journ. Linn. Soc. Bot. XXXVI (1903) 266——*S. laevis* Retz. var. *scaberrima* Benth. Fl. Hongk. (1861) 400——*S. kwangtungensis* Chun et How in Acta Phytotax. Sin. VII (1958) 88, t. 27, syn. nov.

匍匐根状茎短而粗,木质,密被鱗片,鱗片圓筒状,褐色,有多条平行隆起的脉。稈稍細,銳三棱形,长 16—70 厘米或較长,上部被长柔毛。叶基生和稈生,基生者仅具閉合叶鞘而无叶片,鞘淡褐色,具三稜,各稜被长柔毛,各面被短柔毛,无翅,頂端具 3 个三角形齿;稈生者具叶片,叶片线形,向頂端漸狹,頂端鈍,宽 1.2—1.5 厘米,边缘粗糙,两面被长柔毛,叶鞘与基生的叶鞘相似,惟頂端具短三角形、膜質的叶舌。苞片叶状,具鞘,小苞片刚毛状,均被长柔毛;圓錐花序輪廓卵形,长 2.5—6 厘米;小穗披針形,长 8—10 毫米,全被长柔毛,两性小穗和雄小穗均占多数,具 14—16 片鱗片;

