

**Scleria sumatrensis** Retz. Obs. V (1789) 19, t. 2; Ohwi, Cyper. Jap. II (1944) 5—*Scleria fauriei* Ohwi in Act. Phytotax. et Geobot. I (1942) 78.

植株粗壮。稈三棱形，直径約 6—7 毫米，无毛。叶 3 个假輪生，綫形，向頂端漸狹，頂端尾状，長約 40 厘米，寬 10—13 毫米，厚紙質，稍粗糙；叶鞘紙質，長約 4 厘米，在稈上部的鞘无翅，下部的（据 Ohwi 氏記載）具翅；叶舌近半圓形，极短，具褐色緣毛。圓錐花序由頂生和几个相距稍远的側生枝圓錐花序組成，側生者常 2—3 个生在一起；支圓錐花序長 6—7 厘米，寬約 10 厘米，分枝長而平展，花序軸与分枝均具稜；小苞片剛毛状，基部寬，兩側被毛；小穗單生或 2 个生在一起，長約 5 毫米，棕色；基部的鱗片 2 列；雄小穗長圓状卵形，頂端截形；鱗片長 2—3.5 毫米，锈色或棕色，在下部的几片膜質，具龙骨状突起，頂端具短尖，在上部的較薄；雌小穗披針形，頂端漸尖；鱗片寬卵状披針形、卵形或長圓状卵形，具龙骨状突起，頂端具短尖；雄花具 3 个雄蕊，花藥綫形，長 1.2 毫米，藥隔突出部分長約为花藥的 1/4；柱头 3。小坚果扁球形，頂端具短尖，長 1.5 毫米，直径 2—2.5 毫米，表面具近六角形网紋和疏柔毛；下位盘为杯状，圍繞小坚果周围，高約为小坚果的 1/2—4/5，3 裂，裂片頂端具齿，平滑，光亮，褐色或紫色。 花果期 4 月。

产于广东海南島；生长在溪边。也分布于印度、錫兰、馬來亚、印度尼西亚、越南、老撾。

## 27. 裂穎茅属——*Diplacrum* R. Br.

R. Br. Prodr. (1810) 241; Böckl. in Linnaea XXXVIII (1847) 433; C. B. Clarke in Kew Bull. Add. Ser. VIII (1908) 134; Ohwi, Cyper. Jap. II (1944) 3; 侯寬昭等，广州植物志 (1956) 766.

一年生細弱草本，具較紆細的須根。叶稈生，綫形，短，具鞘，不具叶舌。聚繖花序短縮成头状，从叶鞘中抽出；小穗較小，花单性，雌雄异穗；雌小穗生于分枝頂端，具 2 片鱗片和 1 朵雌花，鱗片对生，等大，具多条脉，頂端通常 3 裂，中裂片較大，具硬尖；雄小穗側生于雌小穗下面，約具 3 片鱗片和 1—2 朵雄花；鱗片通常质薄而狹；雄蕊 1—3 个；柱头 3。小坚果小，球形，表面具纵肋或网紋，有时頂部被毛，基部具下位盘。

全世界約有 6 种，分布于热带。我国有 1 种，产于南方諸省。

### 1. 裂穎茅 图版 LXX, 1—6

***Diplacrum caricinum*** R. Br. Prodr. (1810) 241; Kunth, Enum. II (1837) 360; Böckl. in Linnaea XXXVIII (1874) 434; Goebel in Ann. Jard. Bot. Buitenz