

15. 黄藤属——*Daemonorops* Bl.

Bl. in Schult. f. Syst. Veg. 7:1333. 1830; Mart. Hist. Nat. Palm. 3:203. 1838; Kunth, Enum. Pl. 3:201. 1841; Becc. et Hook. f. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 6:462. 1893; Becc. in Ann. Roy. Bot. Gard. Calc. 12(2):25. 1911; Conrard in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 6:1 048. 1937; Furtado in Gard. Bull. Singap. 14:49. 1953; 海南植物志 4:172. 1977; J. Dransf. Man. Ratt. Malay Pen. 75. 1979; N. Uhl et J. Dransf., Gen. Palm. 253—255. 1987.

茎直立或攀援，单生或丛生，多次开花（罕为一次开花）结实。叶羽状全裂，羽片多数，狭长，叶轴顶端常延伸为具爪状刺的纤鞭；叶鞘圆筒形，不具纤鞭，有散生或成横列的刺。雌雄异株。雌雄花序外表相似，开花前为纺锤形或圆筒形，大佛焰苞（即着生在花序总梗上的佛焰苞）初时舟状或圆筒状，外面具直刺，开花后纵向劈裂或张开成扁平状并常脱落；分枝上的二级佛焰苞具不明显的极短的或近漏斗状鳞片。雄花序开花时在舟状佛焰苞组的种类中呈密集圆锥状，在早落佛焰苞组（我国不产）的种类中呈延长状、狭而直的花序，罕为铺散状；雄小穗轴通常互生二列的花，小佛焰苞鳞片状；总苞不明显，雄花单生于小佛焰苞里，花萼小，近杯状，具3齿或甚至圆筒状，花冠长于花萼，几乎裂至基部成3片，雄蕊6枚；雌花序圆锥状，常密集，或多少有些铺散，小穗轴的每朵雌花常伴随着1朵中性花，雌花的小佛焰苞短环状，极少为漏斗形；总苞托梗状，截平，或几乎没有鳞片，在其顶端着生总苞；总苞通常截平或很少为杯状；中性花的小窠明显；雌花大于雄花，卵形，花萼杯状，截平或浅3齿，花冠长于花萼，退化雄蕊6枚在基部合生成环状；子房被鳞片，不完全3室，胚珠3，基着，倒生，花柱短或圆锥状，柱头3。果实球形，卵形或椭圆形，顶端多少具喙并冠以外弯的宿存柱头，外果皮薄，被紧贴外折的鳞片。种子通常1颗，球形或稍压扁，被一层或薄或厚的肉质种皮，胚乳深嚼烂状，胚基生。

本属模式种：黑刚毛黄藤 *Daemonorops melanochaetes* Bl.

约115种，分布于亚洲热带的中南半岛至马来群岛及巴布亚新几内亚。我国有1种，分布于广东东南部、香港、海南及广西西南部。

本属中约有10多种，其果实能分泌出红褐色树脂，可作染料和中药“血竭”，如产于印度尼西亚的龙血藤 *Daemonorops draco* Bl. 和产于马来西亚的双叶黄藤 *D. didymophylla* Becc.、小刺黄藤 *D. micracantha* Becc. 和短穗黄藤 *D. brachystachys* Furtado 等。此外，本属多数种类的藤茎如省藤属，可供编织藤器。

1. 黄藤（中国高等植物图鉴） 红藤（海南） 图版16: 1—7

*Daemonorops margaritae* (Hance) Becc. in Rec. Bot. Surv. Ind. 2:220. 1902