

3:206. 1949; Becc. in Rec. Bot. Surv. Ind. 2:203. 1902 et in Ann. Roy. Bot. Gard. Calc. 11(1):202. 1908.

13a. 柳条省藤 (原变种)

var. *viminalis*

原产印度尼西亚的爪哇。我国不产。

13b. 劲棒省藤 (变种) (植物分类学报)

*Calamus viminalis* Willd. var. *fasciculatus* (Roxb.) Becc. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 6: 444. 1892 et in Rec. Bot. Surv. Ind. 2:203. 1902 et in Ann. Roy. Bot. Gard. Calc. 11(1):206. 1908; S. J. Pei et al. in Act. Phytotax. Sin. 27:133. 1989. — *C. fasciculatus* Roxb. Fl. Ind. 3:779. 1832; Kurz, For. Fl. Brit. Burma 2:517. 1877.

攀援藤本, 丛生, 带鞘茎粗 2—3 厘米, 裸茎粗约 1.5 厘米。叶羽状全裂, 长 1—1.5 米, 顶端不具纤鞭; 羽片 2—4 片成组着生, 指向不同方向, 狭披针形, 长 15—40 厘米, 宽 1.5—2.8 厘米, 约 3 条叶脉, 中脉尖突, 其余叶脉较细, 两面均被微刺, 边缘亦具微刺; 叶轴具长 1—4 厘米的单生或 2—3 个聚生的水平或外折的直刺; 叶柄长 10—20 厘米, 两侧具长短不等的直刺; 叶鞘具囊状凸起, 被单生或几个合生成近斜列的长 1—2.5 厘米的扁刺; 托叶鞘很短。雄花序未见; 雌花序二回分枝, 长约 3 米, 顶端具带爪状刺的长纤鞭, 有 4 个分枝花序, 长 30—40 厘米, 每侧有 10—15 个小穗状花序, 长 2.5—13 厘米; 一级佛焰苞长管状, 具散生的爪状短刺; 二级佛焰苞管状漏斗形; 小佛焰苞为短宽的漏斗形; 总苞托极短, 近盘状, 被小佛焰苞支撑和包围着, 总苞近盘状或浅杯状; 中性花的小窠为凹陷的新月形。雌花未见。果被扁平; 果实小, 豌豆状, 球形或稍扁, 有时近陀螺形, 直径 8—9 毫米, 顶端狭圆柱形的喙显著, 鳞片 16—18 纵列, 草黄色, 有光泽, 中央有浅沟槽, 边缘浅灰色, 顶端褐色, 全缘或稍具细的喷蚀状。种子近球形, 压扁, 宽约 6 毫米, 厚 4 毫米, 背面具凸起和深的洼穴, 种脊面稍平扁, 中央有一个圆的合点孔穴; 胚乳均匀, 胚基生。果期 4 月。

产云南南部 (勐腊) 及西部 (盈江)。印度、孟加拉国、缅甸及中南半岛有分布。

在勐腊的傣族村寨中常见栽培。可供编织。

14. 小白藤 (广西植物)

*Calamus balansaeanus* Becc. in Webbia 3:230. 1910 et in Ann. Roy. Bot. Gard. Calc. 11 (Suppl.):121. S. t. 68. 1913; Conrard in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 6:1041. 1937; C.F. Wei in Guihaia 6:32. 1986.

14a. 小白藤 (原变种)

var. *balansaeanus*

茎纤细, 初时直立, 高 1.5 米, 多少为攀援状, 带鞘茎粗约 8 毫米。叶羽状全裂, 长达 85 厘米, 顶端不具纤鞭, 每侧约有羽片 25—28 片, 不整齐地每 3—4 片或更多片靠近成组