

色,背面略白色,3—6条明显的叶脉,上面、边缘和先端被微刺;叶柄长10厘米;叶柄及叶轴具单生、下弯的长约2毫米的爪状刺,叶鞘上囊状凸起不明显,密被扁平、狭长、淡白色长7—8毫米的小刺,叶鞘口密被较长的刚毛。雄花序二回分枝,鞭状,长65—80厘米,顶端具纤鞭;花序轴纤细,被下弯的长约2毫米、顶端黑色的小刺;一级佛焰苞狭管状,具爪状刺,顶端膨大,一侧延伸为三角形的尖,不断裂;有4—6个分枝花序,长8—15厘米,每侧约有7个小穗状花序;二级佛焰苞短管状,向上稍膨大,顶端一侧延伸;小穗状花序着生于佛焰苞口,长2—4厘米,每侧有花10—16朵;雄花花萼杯状,长约1毫米,顶端3裂;花冠裂片长圆形,长2.5毫米;雄蕊6枚;雌花未见;果实只见到碎片,呈球形,直径8—9毫米,鳞片16—17纵列,草黄色,中央具不明显的浅槽,边缘红褐色,向顶端渐宽,啮蚀状,顶端略流苏状。种子为不规则的近半球状,具棱,长6毫米,宽5毫米,略扁,种脊面中央具圆而深的合点孔穴,胚乳均匀,胚基生。花期1月,果期8月。

产海南南部。生于密林中。模式标本采自陵水。

藤茎可供编织。

16. 多刺鸡藤 (海南植物志) 高山鸡藤 (海南)

Calamus tetradactyloides Burret in Notizbl. Bot. Gart. Berlin 13:596. 1937; 中国高等植物图鉴 5: 349, 图 7527. 1976; 海南植物志 4: 175. 1977; C.F. Wei in Guihaia 6:32. 1986.

攀援藤本,长4—10米,带鞘茎粗8—10毫米,裸茎粗3.5—5毫米。叶羽状全裂,长达50厘米,顶端不具纤鞭,每侧有羽片4—10片,不整齐排列,顶端常有4片聚生;羽片狭披针形,长15—22厘米,宽1—2厘米,先端短渐尖,边缘及先端被刚毛,3条明显叶脉,疏被刚毛,横脉明显、间断;叶轴、叶柄均具下弯的爪状刺,叶鞘稍具囊状凸起,密被淡红褐色的长6—12毫米的细刺,叶鞘口的刺特别密集。托叶鞘很短。雌、雄花序二回分枝,细长,鞭状,长40—70厘米,花序轴上具单生或合生的爪状刺;一级佛焰苞狭长管状,无刺或疏被小刺;分枝花序2—5个,上有3—5个小穗状花序,长5—13厘米,每侧有10—20朵花;小佛焰苞短管状漏斗形,上部扩大,一侧延伸为三角形的尖头。雄花长4毫米;花萼杯状,长2毫米,顶端具三角形的齿;花冠裂片长于花萼的2倍,长圆形,长约4毫米,顶端急尖;雌花未见。果实着生在小佛焰苞口的上面;总苞托几扁平,不具梗状,果被不具梗,基部有脐状凸起。果实近球形,直径约10—13毫米,顶端具1.5—2毫米长的喙,鳞片18—20纵列,中央有不明显的浅沟槽,草黄色,边缘暗红褐色,啮蚀状。种子近半球形,长8毫米,宽7毫米,厚6毫米,表面有多个凹面和凸起的棱,种脊面中央有下凹的合点孔穴,胚乳均匀,胚基生。花果期12月。

产海南。生于密林中。模式标本采自崖县。

藤茎可供编织藤器。

17. 瑶山省藤 (广西植物名录)