

子近球形或椭圆形,稍扁,长1.6—1.7厘米,宽1.2—1.5厘米,厚1.1—1.2厘米,表面具明显的瘤突和洼穴,合点孔穴椭圆形,胚乳嚼烂状,胚基生稍偏离。 花果期12—1月。

产云南西部。生于海拔1350—1450米的常绿阔叶林中。模式标本采自盈江的铜壁关。

藤茎质地中上等;是较好的编织原料。

32c. 高地省藤 (变种) (植物分类学报)

var. *alpinus* S. J. Pei et S. Y. Chen in Act. Phytotax. Sin. 27:141. 1989. —
C. *khasianus* auct. non Becc.: C.F. Wei in Guihaia 6:39. 1986, quoad specimen S. J. Pei 14287.

本变种与原变种的区别为:雌花序较短(35—50厘米),分枝花序较少(3—4个),雌花较稀疏;叶鞘上的刺稍狭窄而稍密,大刺之间的小刺较长,呈水平或微向上;羽片2—3片成组排列。 花果期4—5月。

产云南南部。生于海拔1400—1900米的常绿阔叶林中。模式标本采自勐腊。

32d. 版纳省藤 (变种) (植物分类学报) 图版 23:6—7

var. *xishuangbannaensis* S. J. Pei et S. Y. Chen in Act. Phytotax. Sin. 27:141. 1989.

本变种与原变种的区别为:羽片通常每2片成组排列;雌花序较长(长1.2米),分枝花序较多(5—7个),小穗状花序亦较多;叶鞘上的刺与高地省藤相似。 果期2—3月。

产云南南部。生于海拔1550米的常绿阔叶林中。模式标本采自景洪。

藤茎质地中上等,可供编织藤器。

32e. 勐龙省藤 (变种) (植物分类学报)

var. *menglhengensis* S. J. Pei et S. Y. Chen in Act. Phytotax. Sin. 27:141—142. 1989.

本变种与原变种的区别为:叶鞘上的刺较多而密,向上或部分呈水平状,靠近叶腋部的刺更细长,大刺之间的小刺亦较长,不象原变种那样整齐排列;果实与鳞片均比原变种和其它变种小(果实直径约1.6厘米)。 果期冬季。

产云南南部。生于海拔1500米的常绿阔叶林中。模式标本采自景洪。

33. 管苞省藤 (新拟)

Calamus siphonospathus Mart. Hist. Nat. Palm. 3:342. 1849: Becc. in Rec. Bot. Surv. Ind. 2:213. 1902 et in Ann. Roy. Bot. Gard. Calc. 11(1):471. 1908.

33a. 管苞省藤 (原变种)

var. *siphonospathus*

原产菲律宾。我国不产。

33b. 兰屿省藤 (变种) (中华林学季刊)

var. *sublaevis* Becc. in Webbia 1: 352. 1905 et in Ann. Roy. Bot. Gard.