

..... 6. 台湾石柑 *P. warburgii* Engl.

7. 叶片倒卵披针形至披针状长圆形, 长 6—8 厘米, 宽 2.5—3.5 厘米; 叶柄倒卵状长圆形至长楔形, 长 1—4 厘米, 宽 0.5—1.2 厘米..... 7. 石柑子 *P. chinensis* (Raf.) Merr.

1. 叶柄远长于叶片, 叶片长 3—4 厘米以下, 叶柄长 13—15 厘米; 肉穗花序细圆柱形, 长 5—6 厘米, 粗 1.5—2 毫米..... 8. 百足藤 *P. repens* (Lour.) Druce

1. 螳螂跌打(云南思茅) 硬骨散(思茅), “歪淋”(傣族语) 图版 3: 1—7

Pothos scandens L., Sp. Pl. ed. 1: 968. 1753; Wight, Icon. Pl. 3: t. 776. 1843; Engl. in DC., Monogr. Phan. 2: 84. 1879, in Engl., Pflanzenr. 21(4, 23B): 26. 1905 (non Bot. Reg. tab. 1337. 1830, nec. Hook. Ic. Pl. tab. 175. 1837); Ridl., Fl. Malay. Penins. 5: 127. 1925; Gagn. in Lecte., Fl. Gén. Indo-Chine 6: 1082. 1942; S. Y. Hu in Dansk Bot. Arkiv 23 (4): 413. 1968.

附生藤本, 长 4—6 米以上。茎圆柱形, 具细条纹, 径 1.5—2 毫米, 节间长 2—2.5 厘米。老枝节上常有气生根; 花枝多披散。叶形多变。叶片纸质, 表面绿色, 背面淡绿色, 披针形至线状披针形, 基部钝圆, 先端渐尖, 长 4—8 厘米, 宽 1—3 厘米, 有时在小枝下部退化为长仅 1—2 毫米的小尖头; 基出脉 3 对, 纤细, 细脉倾斜, 网结。叶柄楔形, 先端截平或微下凹, 长 4—8 (—10) 厘米, 宽 1—2.3 厘米, 多少具耳, 脉多, 平行。花序小, 单生叶腋。序柄短, 长约 5—8 毫米; 基部苞片 6—8 枚, 绿色, 覆瓦状排列, 卵形, 锐尖, 小, 上部的长约 4 毫米。佛焰苞极小, 紫色, 舟状, 长 5—6 毫米。肉穗花序淡绿色、淡黄至黄色, 近圆球形或椭圆形, 长 5—6 毫米, 粗 4—5 毫米, 具梗, 梗长 4—5 毫米; 蕾时直立, 花时从梗基部作 180° 的内折或扭转 270°, 因而佛焰苞直立, 而肉穗花序下垂或扭向一侧。浆果绿色, 成熟时红色或黄色, 长圆状卵形, 长不及 1 厘米, 粗 5—6 毫米。 花果期四季。

产云南南部至东南部, 在海拔 200—1000 米的山坡、平坝或河漫滩雨林及季雨林中较常见。多附生于树干或石崖上。自孟加拉锡尔赫特, 南达斯里兰卡, 东经安达曼群岛、中南半岛至菲律宾, 东南经马来半岛、苏门答腊至爪哇、加里曼丹均有分布。

茎叶入药。治跌打损伤、骨折、风湿骨痛、腰腿痛。傣族群众用叶泡水作茶饮。

2. 紫苞石柑

Pothos cathcartii Schott, Aroid. 1: 12, t. 44, 45. 1853; Engl. in DC., Monogr. Phan. 2: 85. 1879, in Engl., Pflanzenr. 21 (4, 23B): 27. 1905; Gagn. in Lecte., Fl. Gén. Indo-Chine 6: 1086. 1942; S. Y. Hu in Dansk Bot. Arkiv 23 (4): 413. 1968; Hara, Fl. E. Himal. ed. 2: 155. 1971.

攀援亚灌木, 长 5 米以上。枝圆柱形, 因叶柄下延而具棱, 有细条纹; 节间长 1—2 厘米。叶片长圆形或卵状长圆形, 长 5.5—9 厘米, 宽 2—2.5 厘米, 先端尾状渐尖, 基部钝或圆形, 叶脉细弱, 侧脉 3 对, 2 对由中肋基部伸出, 另 1 对由中肋中部伸出, 细脉倾斜, 多数, 网结; 叶柄宽, 长圆状楔形, 先端具短耳或否, 浑圆或截平, 形状多变, 与叶片近等长, 长

4—8 厘米,宽 0.5—1 厘米,侧脉 2—3 对从中肋上部出发,至边缘下弯而平行。花序腋生;苞片 4—5,覆瓦状排列,卵形,上面的较大,长 5—15 毫米;花序柄超过苞片,长 2—4 厘米;佛焰苞紫褐色,宽卵圆形,锐尖,长 2 厘米,宽 2.3 厘米,展开或反折,基部沿序柄稍下延;肉穗花序直立,具长 5 毫米的梗,长圆形或椭圆形,长约 10 毫米,仅达佛焰苞的中部,粗 7—8 毫米。花期 4 月。

产云南西南部、南部及东南部,附生于海拔 500—1600 米的密林中树干上。分布于锡金、不丹、孟加拉、印度东北部、缅甸北部、越南北部、柬埔寨、泰国。

3. 龙州石柑

Pothos balansae Engl. in Engl., Bot. Jahrb. 25: 3. 1898, in Engl., Pflanzenr. 21 (4, 23B): 27, fig. 10. 1905; Gagn. in Lecte., Fl. Gén. Indo-Chine 6: 1087. 1942.

· 附生藤本。小枝下部节间长约 1 厘米,上部的长 2 厘米。鳞叶长 10 厘米,宽 1.6 厘米,短渐尖。花枝下部鳞叶极长,线状披针形。枝下部的叶片短,卵形,长为叶柄的 $1/4$ — $1/5$;上部的叶片长圆形或长圆披针形,渐尖;叶柄宽楔形,先端截平,与叶片等长或稍短;叶片长 8.5—12.5 厘米,宽 3—4 厘米;叶柄长 7—9 厘米,宽 1.5—2.2 厘米;叶脉两面隆起。花序柄比叶柄短,长约 4 厘米,粗 3 毫米。苞片多数,最上的宽卵形,长宽约 2 厘米。佛焰苞为本属国产中最大的,卵形,黄绿色,长 2.5 厘米,宽约 3 厘米。肉穗花序具长约 0.5 厘米的梗,花序长圆形,长 2.5 厘米,粗 2 厘米,花大,直径 3—4 毫米。幼果绿色,成熟黄色。花期 6 月。

产广西龙州大青山。越南北部也有。

4. 地柑(广西) 葫芦藤(龙州)

Pothos pilulifer Buchet ex Gagn. in Lecte., Fl. Gén. Indo-Chine 6: 1084, fig. 102: 4. 1942.

攀援植物,长 2—3 米。小枝绿色,有纵条纹,具四棱;节间长 2—3 厘米。叶革质,表面黄绿色,背面苍黄色;叶片椭圆形,急渐尖,先端有芒尖,长 7—9 厘米(包括长 10—15 毫米的尖头),宽 2.5—4.5 厘米,侧脉 3 对从中肋伸出,另 1 对基出,细脉多数,近平行、倾斜、网结,明显凸起;叶柄短小,长 0.5—2.5 厘米,宽 0.7—1.5 厘米,倒卵形,截平,具耳;枝上部的叶柄更短,先端钝或浑圆,无耳。花序腋生:苞片 4—5,小,长 2—6 毫米,上面的较长,具纵脉;序柄和梗长 1—2 厘米;佛焰苞卵形,反折,长 5 毫米。肉穗花序黄绿色,圆球形,径约 5—6 毫米。花期 12—7 月。

产广西西南部至云南东南部,常附生于海拔 200—1000 米的密林中岩石上。越南北部也有。

全株入药,据称能清心、泻热、治癫狂。

5. 长梗石柑 图版 3: 8