

4—8 厘米,宽 0.5—1 厘米,侧脉 2—3 对从中肋上部出发,至边缘下弯而平行。花序腋生;苞片 4—5,覆瓦状排列,卵形,上面的较大,长 5—15 毫米;花序柄超过苞片,长 2—4 厘米;佛焰苞紫褐色,宽卵圆形,锐尖,长 2 厘米,宽 2.3 厘米,展开或反折,基部沿序柄稍下延;肉穗花序直立,具长 5 毫米的梗,长圆形或椭圆形,长约 10 毫米,仅达佛焰苞的中部,粗 7—8 毫米。花期 4 月。

产云南西南部、南部及东南部,附生于海拔 500—1600 米的密林中树干上。分布于锡金、不丹、孟加拉、印度东北部、缅甸北部、越南北部、柬埔寨、泰国。

3. 龙州石柑

Pothos balansae Engl. in Engl., Bot. Jahrb. 25: 3. 1898, in Engl., Pflanzenr. 21 (4, 23B): 27, fig. 10. 1905; Gagn. in Lecte., Fl. Gén. Indo-Chine 6: 1087. 1942.

· 附生藤本。小枝下部节间长约 1 厘米,上部的长 2 厘米。鳞叶长 10 厘米,宽 1.6 厘米,短渐尖。花枝下部鳞叶极长,线状披针形。枝下部的叶片短,卵形,长为叶柄的 $1/4$ — $1/5$;上部的叶片长圆形或长圆披针形,渐尖;叶柄宽楔形,先端截平,与叶片等长或稍短;叶片长 8.5—12.5 厘米,宽 3—4 厘米;叶柄长 7—9 厘米,宽 1.5—2.2 厘米;叶脉两面隆起。花序柄比叶柄短,长约 4 厘米,粗 3 毫米。苞片多数,最上的宽卵形,长宽约 2 厘米。佛焰苞为本属国产中最大的,卵形,黄绿色,长 2.5 厘米,宽约 3 厘米。肉穗花序具长约 0.5 厘米的梗,花序长圆形,长 2.5 厘米,粗 2 厘米,花大,直径 3—4 毫米。幼果绿色,成熟黄色。花期 6 月。

产广西龙州大青山。越南北部也有。

4. 地柑(广西) 葫芦藤(龙州)

Pothos pilulifer Buchet ex Gagn. in Lecte., Fl. Gén. Indo-Chine 6: 1084, fig. 102: 4. 1942.

攀援植物,长 2—3 米。小枝绿色,有纵条纹,具四棱;节间长 2—3 厘米。叶革质,表面黄绿色,背面苍黄色;叶片椭圆形,急渐尖,先端有芒尖,长 7—9 厘米(包括长 10—15 毫米的尖头),宽 2.5—4.5 厘米,侧脉 3 对从中肋伸出,另 1 对基出,细脉多数,近平行、倾斜、网结,明显凸起;叶柄短小,长 0.5—2.5 厘米,宽 0.7—1.5 厘米,倒卵形,截平,具耳;枝上部的叶柄更短,先端钝或浑圆,无耳。花序腋生:苞片 4—5,小,长 2—6 毫米,上面的较长,具纵脉;序柄和梗长 1—2 厘米;佛焰苞卵形,反折,长 5 毫米。肉穗花序黄绿色,圆球形,径约 5—6 毫米。花期 12—7 月。

产广西西南部至云南东南部,常附生于海拔 200—1000 米的密林中岩石上。越南北部也有。

全株入药,据称能清心、泻热、治癫狂。

5. 长梗石柑 图版 3: 8