

Pothos kerrii Buchet ex Gagn. in Lecte., Fl. Gén. Indo-Chine 6: 1085, fig. 102; 5. 1942.

蔓生草质藤本。小枝圆柱形,粗1—2毫米,具4棱,有多数纵条纹,节间长1.5—3厘米。叶薄革质,淡绿色;叶片卵状披针形,渐尖,几成尾状,有短尖头,长6—11厘米,宽2.5—4厘米,基出侧脉2对,由中肋中部伸出的侧脉1对,细脉多数,斜伸,网结;叶柄倒卵形,短,长1—2.2厘米,宽0.5—0.9厘米,先端钝,无耳。花序柄腋生,红褐色,长3.5—4厘米,斜伸或稍下弯,基部苞片3—5,覆瓦状排列,长1—5毫米,具纵纹。佛焰苞短,卵舟状,锐尖,红褐色,长5毫米。肉穗花序球形,直径4—8毫米,淡绿色至黑褐色,具长3—5厘米的梗。花期8月。

产广西龙州。见于海拔300—500米的山谷密林中。附生于石上。老挝也有。

全株供药用,消积治跌打。

与地柑 *P. pilulifer* 较为相近,但本种花序柄和肉穗花序梗明显伸长,共长7.5—8厘米,而地柑的长仅1.3—2厘米。

6. 台湾石柑

Pothos warburgii Engl. in Engl., Bot. Jahrb. 25: 2. 1898, in Engl., Pflanzenr. 21 (4, 23B): 28, fig. 11: A—F. 1905.

附生藤本。小枝具4棱。节间长1厘米,上部伸长。叶片长圆形或长圆状披针形,锐尖,长(2—)6—8厘米,宽1—2厘米;叶柄宽楔形,长0.6—1.2厘米,宽3—4毫米,长为叶片的1/6—1/8。花序柄长于叶柄,下部具苞片5。佛焰苞短卵形,锐尖,长约5毫米。肉穗花序具短梗,卵圆形,长4毫米,粗3毫米,花小。花期3—10月。

我国台湾特有。

7. 石柑子(四川) 竹结草(广西上思),爬山虎(广西南宁),风瘫药、毒蛇上树、上树葫芦(广西金秀),六扑风(广西北流),巴岩香、青葫芦茶、石葫芦(广西苍梧),马连鞍(广西南明),百步藤(广西田阳),石上蟾蜍草(广西昭平),大疮花、葫芦草、石百足(广西玉林),千年青(广西靖西),落山葫芦(广西凌乐、苍梧),小毛铜钱菜(贵州榕江),伸筋草、青竹标、岩石焦(贵州荔波),铁斑鸠、巴岩姜(贵州兴义),石柑儿(贵州合江),关刀草(贵州峨山),猛药(广东英德),铁板草(云南沧源) 图版3: 10

Pothos chinensis (Raf.) Merr. in Journ. Arn. Arb. 19: 210. 1948.——*Tapanava chinensis* Raf., Fl. Tellur. 4: 14. 1838.——*Pothos scandens* sensu Lindl. Bot. Reg. 16: pl. 1337. 1830; Benth., Fl. Hongk. 344. 1861, non L.——*Pothos seemannii* Schott in Bonpl. 5: 45. 1857; Engl. in DC., Monogr. Phan. 2: 83. 1879, in Engl., Pflanzenr. 21 (4, 23B): 29, fig. 12. 1905; N. E. Brown in Journ. Linn. Soc. Bot. 36: 187. 1903; Matsum. et Hayata, in Journ. Coll. Sci. Univ. Tokyo 22: 460. 1906; Hayata, Icon. Pl. Formos. 5: 239, fig. 84. 1915;