

8—9 月成熟。

北京、江苏、福建、台湾、四川、云南及秦岭地区栽培供观赏。原产非洲东北部及南部。常作花束和花圈用花。

2. 红马蹄莲

Zantedeschia rehmannii Engl. in Engl., Bot. Jahrb. 4: 63. 1883, in Engl., Pflanzenr. 64 (4, 23Dc): 65, fig. 30: A—D. 1915.—*Richardia rehmannii* N. E. Brown ex Harrow in Gard. Chron. 4: 570. 1888 (*Lapsu Lehmannii*); Hook. f. in Curtis, Bot. Mag. t. 7436. 1895.

多年生草本，具块茎。叶柄光滑，长 15—20 厘米，先于花序出现，全长具鞘；叶片二面绿色，饰以透明的线形斑纹（昆明栽培的不明显），线状披针形，不等侧，向叶柄下延长，先端长渐狭，长 20—30 厘米，中部宽 3 厘米，侧脉与中肋成 15° 锐角上举。花序柄长 15—20 厘米。佛焰苞长 7—11 厘米；管部长 3.5—5.5 厘米；檐部偏斜，反卷，向上渐狭为锥状尖头；玫瑰红紫色，内面绿白色，向基部过渡为紫色或白色，仅边缘玫瑰红色。肉穗花序具短梗，长 3—5 厘米；雌花序比雄花序短。雌蕊花柱短。浆果倒卵圆形或扁球形，钝，1—2 室，长 6 毫米，直径 5—8 毫米，每室种子 1 枚。种子长 5 毫米。花期 5—6 月，果期 7—8 月。

云南昆明栽培。原产非洲纳塔尔。

美丽的观赏植物。

3. 白马蹄莲

Zantedeschia albo-maculata (Hook. f.) Baill in Bull. Soc. Linn. Par. 1: 254. 1880; Engl. in Engl., Pflanzenr. 64 (4, 23Dc): 67, fig. 30: E—G. 1915.—*Richardia albo-maculata* Hook. f. in Curtis, Bot. Mag. t. 5140. 1859.

多年生草本，具块茎。叶柄长 45—100 厘米，粗 1—2 厘米；叶片长 20—40 厘米，宽 7.5—10 厘米，稍下垂，二面绿色，具白色斑块，长戟形，稀心状箭形，先端骤狭锐尖，侧脉细弱，极多数，表面略下凹，背面稍隆起。佛焰苞长 10 厘米，白色，有时绿色，管部比檐部短 1/2，斜漏斗状，内面基部深紫色；檐部先端渐狭为锥形尖头。肉穗花序：雌花序长 1.5—2 厘米，粗 4—5 毫米，雄花序与雌花序近等长，但稍细。子房 4—5 室，柱头无柄，盘状。浆果扁球形，绿色，直径 1.3 厘米，每室有种子 1—2 枚。果期 8 月（昆明）。

供观赏。

4. 紫心黄马蹄莲

Zantedeschia melanoleuca (Hook. f.) Engl. in Engl., Bot. Jahrb. 4: 64. 1883, in Engl., Pflanzenr. 64 (4, 23Dc): 67. 1915.—*Richardia melanoleuca* Hook. f. in Curtis, Bot. Mag. t. 5765. 1869.

多年生草本。叶柄下部具小刚毛，长 20—50 厘米，下部 1/3 以上具宽鞘。叶片戟形，