

后裂片卵状长圆形，圆而钝，长8—10厘米，中部宽5厘米，基部联合部分短，弯缺狭三角形，后基脉相交成锐角。花序柄圆柱形，细，长18厘米，粗4—5毫米。佛焰苞管部狭卵圆形，长1.5厘米，席卷，粗8毫米；檐部狭长圆形，先端不等的细长渐尖，长5厘米，展开宽2厘米。肉穗花序，雌花序圆柱状，长1—1.2厘米；不育雌花序细圆柱形，长6—7毫米，粗2毫米；能育雄花序长约1.5厘米，粗5毫米；附属器狭圆锥状，近锐尖，长1.1厘米，具不明显的细槽纹。子房卵圆形，花柱短，柱头扁，浅裂；胚珠4—5，基生，直立；雄花有雄蕊6。花期11月。

产广东海南万宁、崖县、定安，生于山谷疏林中。越南北部也有。模式标本采自海南。

4. 箭叶海芋 图版14：10

Alocasia longiloba Miq., Fl. Ind. Bat. 3: 207. 1855; Engl. in DC., Monogr. Phan. 2: 506. 1879; Hook. f., Fl. Brit. Ind. 6: 527. 1893; Engl. et Krause in Engl., Pflanzenr. 71 (4, 23E): 103. 1920; Gagn. in Lecte., Fl. Gén. Indo-Chine 6: 1147. 1942.

多年生上升草本；根茎圆柱形，长15—20厘米以上，粗1—1.5厘米，下部生细圆柱形须根，上部被宿存叶鞘。叶柄绿色，长25—32厘米，基部强烈扩大成鞘状，向上渐狭；叶片绿色或幼时表面淡蓝绿色；成年植株叶片长箭形，长25—45厘米，宽9—19厘米，前裂片长圆状三角形，长15—27厘米，先端渐尖，侧脉4—7，斜伸；后裂片长三角形，长10—18厘米，基部联合2—3.5厘米，弯缺锐三角形，基脉相交成60—80°的锐角。花序柄长18—25厘米。佛焰苞淡绿色，管部长2—3.5厘米，卵形至纺锤形，果时长达5厘米，粗约2厘米；檐部长圆形或披针形，长6—8厘米。肉穗花序长7—8厘米，雌花序圆柱形，长12毫米；雄花序能育部分长2厘米；附属器长4.5厘米，圆柱形，渐尖。雄花有雄蕊3。子房卵圆形，先端渐狭；柱头肾形；胚珠半直立，基生。浆果近球形，淡绿色，直径6—8毫米，内有圆球形种子1枚。果期8—10月。

分布于云南南部、广东海南，广州有栽培，海拔90—1020米，生于林下或灌丛。中南半岛、马来半岛、加里曼丹岛和印度尼西亚爪哇都有。

11. 喜林芋族——Trib. *Philodendreae* Schott

Schott, Syn. Ar. 71. 1856.

攀援植物。肉穗花序分离或部分与佛焰苞合生，无附属器。花单性，无花被，雌雄同株，雄花的雄蕊分离；雌花常有少数假雄蕊。胚珠倒生或直立，珠柄长。种子具胚乳。

27. 喜林芋属——*Philodendron* Schott

Schott, Melet. 1: 19. 1832.

攀援植物，节间多少延长或稀匍匐。茎稀极短缩而近于不存在，有时乔木状具不定气



1. 尖尾芋 *Alocasia cucullata* (Lour.) Schott; 叶片。2—9. 海芋 *Al. macrorrhiza* (L.) Schott; 2. 植株, 3. 佛焰花序, 4. 肉穗花序, 5. 能育雄花, 6. 子房, 7. 柱头正面观, 8. 子房纵剖, 9. 子房横切面。10. 箭叶海芋 *Al. longiloba* Miq.; 叶片。(吴锡麟绘)