

向顶部密被小疣,长35—50厘米,上部粗5—6毫米;叶片暗绿色,心状卵形,长35—48厘米,宽20—30厘米,后裂片半卵形,为前裂片长的 $1/3$ — $1/4$,多少内倾,弯缺深,前裂片向上渐狭,通常先端具短尖头, I级侧脉粗壮,基生的4—7对,由中肋伸出的7—8对,其间有II级侧脉1条。花序柄长4—6厘米,有不连续的白色条纹。佛焰苞长12—14厘米,管部和檐部分异明显,鲜绿色,背面红色,内面苍白带淡黄色;檐部长约3厘米,先端长锥状凸尖,背面红色,内面淡黄色。肉穗花序具短梗,圆柱形;雌花序长8—10厘米,与雄花序等粗。雌蕊圆柱形,长2毫米,粗1毫米,柱头盘状,白色,子房4—5室,胚珠2列。浆果有种子多数,长椭圆形,苍白黄色。

我国台湾有栽培。原产巴西。

2. 箭叶喜林芋

Philodendron sagittifolium Liebm. in Vidensk. Meddelels. Naturhist. Foren.: 17. 1850; Engl. et Krause in Engl., Pflanzenr. 60 (23, Db): 82. 1913.

大型攀援植物,节间长3—5至10厘米,粗2.5—3厘米。鳞叶长线状披针形,具两条龙骨状突起。叶柄长30—40厘米,基部粗1.5厘米,背面圆形,两侧具宽鞘;叶片近革质,长圆状箭形,长30—50厘米,宽12—20厘米,后裂片半长圆形,裂弯深,长7—10厘米,宽与长近相等,前裂片长圆状三角形,向上渐狭,中肋粗, I级侧脉4对,斜伸,基出脉2—3对。花序柄长5—8厘米。佛焰苞管部外面绿色或边缘浅白色,内面紫红色,长圆形,长4—6厘米;檐部白色,先端具短尖突,长5—6厘米。肉穗花序无柄,雌花序浅黄色,圆柱形,长2.4—2.8厘米,粗1厘米,雄花序白色,长7—8厘米。子房长圆形,长2毫米,粗1毫米,5—7室。雄花有雄蕊3—4。浆果污黄色,倒卵圆形,长3.5毫米;种子黄色,椭圆形,长约1毫米。

广州栽培。原产墨西哥。为热带地区常见的栽培观赏植物。

3. 红苞喜林芋

Philodendron erubescens C. Koch et Augustin in Ind. Sem Hort. Berol. App. 6. 1854; Engl. et Krause in Engl., Pflanzenr. 60 (4, 23Db): 98. 1913.

攀援植物,分枝节间淡红色,长3—8厘米,粗1厘米。鳞叶肉质,红色,背面有2条龙骨状突起,长7—10厘米。叶柄腹面扁平,背面圆形,长15—25厘米,粗7—10毫米;叶片纸质,伸长的三角状箭形,长15—25厘米,宽12—18厘米,基部心形,前裂片三角形、半圆形或半卵形,后裂片三角形, I级侧脉4对基出, II级侧脉多数。花序柄长6—7厘米。佛焰苞外面深紫色,内面胭脂红色,兜状舟形,管部卵圆形,长7—8厘米;檐部短卵形,长7厘米,宽4—5厘米,具长约5毫米的尖头,肉穗花序具长约3毫米的梗,雌花序圆柱形,长5厘米,粗1.5厘米,雄花序长10厘米,向上略细。雌蕊倒卵圆形,8室,长约1.5毫米,柱头盘状。雄花通常有雄蕊3。花期11—1月。

广州栽培。原产哥伦比亚。为美丽的观赏植物。