

#### 4. 金叶喜林芋

*Philodendron andreanum* Devansaye in Rev. Hortic. 58: 36. 1886; Engl. et Krause in Engl., Pflanzenr. 60 (4, 23Db): 104. 1913; 正宗严敬, 最新台湾植物总目录: 216. 1936.

攀援植物。茎草绿色, 圆柱形, 粗壮, 下部具白色条纹, 节间长 2 厘米。鳞叶膜质, 变红色, 舟状抱茎。叶柄扭转, 直立, 腹面平坦, 长 50 厘米以上, 下部粗 2 厘米, 渐细; 叶片革质, 鲜绿色, 发亮, 带金黄色; 幼叶赭黄色, 边缘透明, 于扭曲叶柄的最上部突然反折, 长 60—80 厘米, 宽达 25 厘米, 心状长圆形, 前裂片狭长圆形, 先端长渐尖, 后裂片远短于前裂片, 偏斜, 钝, 基部锐尖, I 级侧脉白色, 斜伸, 近边缘时弧曲, 3—4 对基生, 7—8 对从中肋伸出。

我国台湾栽培供观赏。原产哥伦比亚。

#### 5. 心叶喜林芋

*Philodendron gloriosum* André in Ill. Hortic. 194. t. 262. 1876; Engl. in DC., Monogr. Phan. 2: 399. 1879; Engl. et Krause in Engl., Pflanzenr. 60 (4, 23Db): 104. 1913; 正宗严敬, 最新台湾植物总目录: 261. 1936.

攀援植物。茎悬垂, 节间绿色, 长 4—6 厘米, 粗 1.5—2 厘米。鳞叶紫红色, 无龙骨, 长 10—15 厘米, 长期宿存。叶柄下部绿色, 上部和叶片中肋及 I 级侧脉红色, 饰以纵长的白色条纹, 半圆柱形, 长 20—30 厘米, 粗 6—8 毫米; 叶片薄纸质, 表面暗绿色, 边缘红色, 背面苍白色, 心状卵形, 长 15—25 厘米, 宽 12—20 厘米, 后裂片近半圆形, 长 3—5 厘米, 宽 6—9 厘米, 弯缺锐尖, 前裂片先端为弯拱的线形, 狭渐尖, 长为后裂片 3.5—4 倍, I 级侧脉: 基生的 3—4 对, 从中肋两侧生的 3—4 对, II 级侧脉斜伸, 细弱。

我国台湾栽培于园庭供观赏。原产哥伦比亚。

#### 6. 三裂喜林芋

*Philodendron tripartitum* (Jacq.) Schott, Melet. 1: 19. 1832; Engl. et Krause in Engl., Pflanzenr. 60 (4, 23Db): 107, fig. 36; J—T. 1913.

附生或地生藤本。茎节间长 5—12 厘米, 粗 1—1.5 厘米。鳞叶长披针形, 脱落。叶柄圆柱形, 长 20—30 厘米, 下部粗 1.2—1.6 厘米, 向上渐细; 叶片薄革质, 淡绿色或黄绿色, 3 深裂, 裂片近相等, 长 15—25 厘米, 宽 4—7 厘米, 中裂片长披针形, 先端具短凸尖, 侧裂片极不等侧, 先端略钝; 中肋粗, 前裂片 I 级侧脉 2 对, 上升, 侧裂片外侧有侧脉 4, 内侧 1—2。花序柄单生, 短, 长 3—5 厘米, 粗 5—8 毫米。佛焰苞微白色或白绿色, 向上变黄色, 管部长圆形, 长 3—4 厘米; 檐部卵形或卵状长圆形, 先端短渐尖, 长 5—6 厘米, 宽约 3 厘米。肉穗花序具长 2—4 厘米的梗, 指状; 雌花序长 3—4 厘米, 粗 8—10 毫米, 雄花序长 3.5—5 厘米, 粗与雌花序近相等, 向上略细。雌蕊圆柱形, 长 1.5—1.8 毫米, 7—11 室, 每室胚珠 1—2, 柱头小, 圆形, 浆果鲜红色。