

径(基部)6厘米,基部钝,上部收缩,外面浅绿色,内面深紫色具疣凸;檐部钟状,上部卵状三角形,长20厘米,宽12厘米,先端渐尖,边缘浅波状,外面淡绿色,内面粉红带绿色,光滑。肉穗花序无梗,长圆柱形,长40厘米,几为佛焰苞长的2倍,雌花序长2厘米,粗1.5厘米,连柱头在内粗2厘米;雄花序深黄色,长4厘米,粗2.2厘米,花密,散生近于直立的深紫色中性花;附属器长圆柱形,内凹,长32厘米,粗2厘米,向上渐狭,先端钝,深紫色,向上渐淡,表面有不规则的扁圆形斑块,密生长1厘米的直立硬毛。子房近球形,长2毫米,直径1.5毫米,白色,2室,花柱长1毫米,深紫色,渐狭,柱头黄色,浅2裂;每室胚珠1枚。雄花小,黄色,花药无柄,横生,4室,粗1毫米,较狭。花期6月。

我国特有,产台湾高雄。

## 2. 白毛磨芋

*Amorphophallus niimurai* Yamamoto in Journ. Soc. Trop. Agric. Taiwan 5: 346. 1933.—*Amorphophallus hirta* Yamamoto l. c. 5: 180, fig. 7: A, B. 1933, non N. E. Brown in Journ. Linn. Soc. Bot. 36: 181. 1903.

块茎扁球形,直径约10厘米。叶不详。花序连柄长40厘米,花序柄绿色,粗壮,光滑,长约10厘米,粗1厘米;鳞叶2,膜质,淡紫色,具白色斑块,线状披针形,不等长,外面的长8厘米,宽2.5厘米;内面的长16厘米,宽3厘米。佛焰苞下部席卷,倒圆锥状或短圆柱形,上部钟状展开,管部粗厚,长6厘米,粗4厘米,基部和先端略狭,外面绿色,内面深紫色,密生疣突;檐部膜质,深心形,明显席卷,先端锐尖,边缘折波状,长17厘米,宽13厘米,内面紫色,外面苍白色,具稀疏的白色斑块,二面边缘白色。肉穗花序无梗,长圆柱形,比佛焰苞长1倍,长30厘米,雌花密,长2厘米,粗1.5厘米,连花柱粗2厘米;雄花序长3厘米,粗1厘米,在雌、雄花序之间有星散、直立的中性花;附属器线状圆柱形,紫色,长25厘米,粗1.5厘米,向上渐细,表面有不规则的扁圆形斑块,具白色弯曲的长毛。子房近球形,淡紫色或淡绿色,直径3毫米,花柱长3毫米,深紫色,柱头头状,2浅裂,紫色,子房2室。雄花小,黄色;花药无柄,横生,长2毫米,粗1毫米,2室,花粉细小,黄色。花期5月。

我国特有,产台湾省。

3. 疏毛磨芋 土半夏(浙江龙泉),伍花莲(浙江江浦),蛇六谷、鬼蜡烛、磨芋、蛇头草(上海) 图版16: 1—4

*Amorphophallus sinensis* Belval in Bull. Soc. Bot. France 80: 98. 1933.

块茎扁球形,直径3—20厘米。鳞叶2,卵形,披针状卵形,有青紫色、淡红色斑块。叶柄长可达1.5米,光滑,绿色,具白色斑块;叶片3裂,第一次裂片二歧分叉,最后羽状深裂,小裂片卵状长圆形,渐尖,长6—10厘米,宽3—3.5厘米。花序柄长25—45厘米,光滑,绿色,具白色斑块。佛焰苞长15—20厘米,管部席卷,外面绿色,具白色斑块,内面暗青紫色,基部有疣皱,长6—8厘米,粗1—2厘米,檐部展开为斜漏斗状,边缘波状,膜质,长渐尖,