

米,下部席卷,内面基部具疣;檐部宽卵形,锐尖,深紫色。肉穗花序无梗,为佛焰苞长的2倍,雌花序长1.2—2厘米,粗0.8—1.8厘米,圆柱形;雄花序长2—4厘米,倒圆锥形;附属器长12—31厘米,长纺锤形或长圆柱形,锐尖。子房球形,2室,花柱长1—1.5毫米,基部具环,柱头大,头状,全缘。花期5月。

我国特有,产台湾省台南、高雄。模式标本采自高雄。

17. 香港磨芋

Amorphophallus oncophyllus Prain ex Hook. f., Fl. Brit. Ind. 6: 516. 1893, in Curtis, Bot. Mag. t. 7327. 1893; Engl. in Engl., Pflanzenr. 48(4,23C): 98. 1911; Gagn. in Lecte., Fl. Gén. Indo-Chine 6: 1170. 1942.

块茎球形,直径约25厘米,具小球茎。叶柄长达90厘米,粗2.5厘米,具淡绿色斑块。叶片3次羽状全裂,I、II、III级裂片基部有珠芽,小裂片披针形,长15—25厘米,宽5—6厘米,基部楔形,先端骤狭渐尖,侧脉多数,斜伸,近边缘连结为集合脉。花序柄长40—50厘米。佛焰苞长约30厘米,宽卵圆形,管部粗约8厘米,基部圆形,浅绿白色,具斑纹;檐部长圆形或卵圆形,宽17厘米,展开,先端外仰,具赭红色斑块,中间浅绿色,边缘赭红色。肉穗花序比佛焰苞约长1/3,直立,雄花序与雌花序近等长,长约4厘米,粗1.5厘米;附属器长圆锥形,长约9厘米,中部粗约3厘米,向上渐狭,金黄色。雄蕊倒卵圆形,药室顶孔长圆形。子房扁球形,2—3室,柱头近无柄,2—3浅裂;胚珠半倒生,珠柄长,生于基底。

产广东沿海岛屿。印度安达曼群岛、泰国、马来半岛也有。标本未见。

18. 珠芽磨芋 图版17: 6—9

Amorphophallus bulbifer (Roxb.) Blume in Rumphia 1: 148. 1835; Kunth Enum. Pl. 3: 34. 1841; Regel in Gartenfl. t. 688. 1871; Engl. in DC., Monogr. Phan. 2: 317. 1879, in Engl., Pflanzenr. 48 (4, 23C): 98. 1911; Hook. f., Fl. Brit. Ind. 6: 515. 1893.—*Arum bulbiferum* Roxb., Fl. Ind. 3: 510. 1832; Wight, Icon. Pl. t. 783. 1843; Sims in Curtis, Bot. Mag. t. 2072. 1819 et t. 2503. 1824.

块茎近球形,直径5—8厘米,密生肉质根及纤维状分枝须根。叶柄长可达1米,粗1.5—3厘米,光滑,污黄色或榄绿色,饰以不规则的、有时汇合的苍白色斑块或线纹;叶片绿色,背面淡绿色,3裂,在叶柄的顶头有珠芽1枚;珠芽球形,暗紫色,直径0.5—1厘米;I次裂片具长2—3厘米的柄,长20—30厘米,分叉;II次裂片羽状分裂,稀2次羽裂;下部的小裂片长4—6厘米,宽3—4厘米,卵形,上部的小裂片长10—12厘米,宽6—7厘米,长圆披针形,均长渐尖,基部宽楔形,外侧下延;幼株I次裂片1—2次分叉,小裂片长圆形,长10—13厘米,宽3—5厘米,骤狭具尾尖,各小裂片I、II级侧脉干时表面下凹,背面稍隆起,弧曲,近边缘连接为集合脉;III级侧脉纤细,其间布以极细微的网脉。花序柄