

部, 海拔 960—3000 米, 生于林下、灌丛或草坡。模式标本采自四川宝兴。

块茎入药, 有毒, 功效同天南星(《植物名实图考》), 民间用以外敷乳腺炎, 颈淋巴结核, 无名肿毒, 毒蛇咬伤(云南昆明); 内服可治跌打损伤(云南保山); 兽医用于治疮黄肿毒、锁喉黄(云南富民)。

15. 螃蟹七(湖北巴东、鹤峰、利川) 天南星、虎掌南星(湖北利川), 白南星(湖北巴东), 红南星(四川巫溪), 郎毒(四川云阳) 图版 24: 8—9

*Arisaema fargesii* Buchet in Lecte., Not. Syst. 1 (12): 371. 1911; Engl. in Engl., Pflanzenr. 73 (4, 23F): 165. 1920; C. H. Wright in Curtis, Bot. Mag. t. 8861. 1920.—*A. purpureogaleatum* auct. non Engl.: 秦岭植物志 1 (1): 281. 1976.—*Typhonium giganteum* auct. non Engl.: K. S. Hao in Engl., Bot. Jahrb. 68: 586. 1938, quoad specim. Hao 395.

块茎扁球形, 直径 3—5 厘米, 常具多数小球茎。鳞叶 3, 褐色, 宽 2—2.5 厘米, 向上渐狭, 最上的长约 15 厘米。叶柄长 20—40 厘米, 粗 6—7 毫米, 下部 1/4 具鞘; 叶片 3 深裂至 3 全裂, 裂片无柄, 干时膜质, 全缘, 中裂片近菱形, 卵状长圆形至卵形, 凸尖或急尖, 基部短楔形或与侧裂片联合, 长 12—17—32 厘米, 宽 9—16—27 厘米; 侧裂片斜椭圆形, 外侧较宽, 半卵形, 长 9—23 厘米, 宽 6—16 厘米, 中肋背面隆起, 侧脉 9—10 对, 集合脉距边缘 2—3—10 毫米。花序柄比叶柄短而细, 长 18—26 厘米。佛焰苞紫色, 有苍白色线状条纹, 管部近圆柱形, 长 4—8 厘米, 直径 1.5—2 厘米, 喉部边缘耳状反卷; 檐部长圆三角形, 拱形下弯或近直立, 长 6—12 厘米, 宽 4—4.5 厘米, 长渐尖, 具长 1—4 厘米的尾尖。肉穗花序单性, 雄花序长 2.5—3 厘米, 圆柱形, 粗 4—5 毫米, 雄花有花药 2—4, 药室卵圆形, 基部叉开, 顶孔开裂; 雌花序长约 2 厘米, 花密, 子房具棱, 顶部常圆形, 花柱极短而粗, 柱头有毛, 胚珠少; 各附属器粗壮, 伸长的圆锥状, 长 4.5—9 厘米, 下部粗 7—15 毫米, 基部骤狭成短柄, 非截形, 上部长渐尖, 先端钝, 粗 1.5—5 毫米, 近直立或上部略弯。花期 5—6 月。

我国特有, 产湖北西部(利川、巴东、建始、鹤丰)、四川东部至北部(巫溪、云阳、城口、平武、青川)、甘肃南部(文县), 海拔 900—1600 米, 生于林下或灌丛内多石处。模式标本采自四川城口。

块茎入药, 可治跌打损伤、风湿性关节炎、肢体麻木。甘肃用以代天南星(甘肃中草药 1: 78, 图 35, 误作 *A. purpureogaleatum* Engl.)。

本种与象头花 *A. franchetianum* 较为接近, 但叶裂片较为狭长, 质薄, 中裂片常比侧裂片大一倍; 佛焰苞拱形下弯或近直立, 决不成盔状; 附属器粗壮, 近直立, 显然不同, 从分布区看, 本种为象头花在巴山、秦岭南地区的替代种。

Fl. E. Himal. ed. 2: 329. 1971.—Sect. *Speciosa* Engl. in Engl., Pflanzenr. 73 (4, 23F): 151, 193. 1920.—Sect. *Wallichiana* Engl. l. c. 151 et 211. 1920 excl. *A. delavayi*.—Sect. *Lunata* Engl., l. c. 151 et 215. 1920.

植物具球形块茎或粗厚根茎。叶片3(—5)全裂。佛焰苞檐部下弯成盔状，常宽阔，有时翼状扩展。附属器长鞭状，伸出甚长，下部增粗，下部线形下垂，基部常扩大为肉质的圆盘，具柄。花药药室通常顶部融合，裂缝呈马蹄形或新月形。

#### 16. 多脉南星 图版 25: 5—7


**Arisaema costatum** (Wall.) Mart. in Flora 14: 458. 1831, in nota; Blume in Rumphia 1: 101. 1835; Engl. in DC., Monogr. Phan. 2: 541. 1879, in Engl., Pflanzenr. 73 (4, 23F): 217. 1920; Hook. f. Fl. Brit. Ind. 6: 501. 1893; Hara, Fl. E. Himal. ed. 2: 332, pl. 6: a et 17, fig. 50; C. 1971.—*Arum costatum* Wallich, Tent. Fl. Nepal. 28, t. 19. 1824.

块茎扁球形，直径3—5厘米。鳞叶披针形，长渐狭，锐尖，展平宽约4厘米，内面的长达25厘米。叶1，叶柄绿色，常带紫色，长30—55厘米，下部1/4—1/3具鞘，上部粗1厘米；叶片3全裂，表面深绿色，背面淡绿色，裂片具短柄或近无柄，中裂片椭圆形或长圆形，长16—30厘米，宽9—16厘米，渐尖；侧裂片极偏斜，外侧常为内侧宽的2倍，外侧基部耳状，内侧渐狭；侧脉极多数，斜伸，几平行，背面明显隆起。花序柄比叶柄短，长20—45厘米。佛焰苞暗紫色，具白色纵条纹，管部圆柱形，长4—8厘米，内面有明显的肋脊，喉部边缘稍外卷；檐部长圆卵形，下弯，长4—10厘米，宽2.5—5厘米，先端骤尖成1—4厘米长的尾。肉穗花序单性，雄花序长2—3.7厘米，花疏，雄花具柄，花药3—5，裂缝成马蹄形；雌花序长2.5—3厘米，粗1.5厘米，子房花柱短，柱头小，盘状，白色；各附属器具长5—8毫米、粗2—3毫米的柄，全长30—50厘米，暗紫色，基部扩大，基底截平，向上渐狭为线形，伸出佛焰苞后蜿蜒下垂。 花期6月。

产西藏南部聂拉木，生于海拔2300—2400米的林间草地。尼泊尔也有。模式标本采自尼泊尔。

#### 17. 美丽南星 图版 25: 1—4

**Arisaema speciosum** (Wall.) Mart. in Flora 14: 458. 1831 in nota; Kunth, Enum. Pl. 3: 18. 1841; Hook. f. in Curtis, Bot., Mag. t. 5964. 1872, Fl. Brit. Ind. 6: 500. 1893; Engl. in DC., Monogr. Phan. 2: 539. 1879, et in Engl., Pflanzenr. 72 (4, 23F): 192, fig. 44. 1920; Hand.-Mazt., Symb. Sin. 7: 1366. 1936; Hara, Fl. E. Himal. ed. 1: 396. 1966, ed. 2: 329, Pl. 15: C, fig. 50; A. 1971.—*Arum speciosum* Wall., Tent. Fl. Nepal. 29, t. 20. 1824.—*Arisaema eminens* Schott in Österr. Bot. Wochensbl. 7: 357. 1857, Prodr. 30. 1860.—*A. speciosum* var. *eminens* (Schott) Engl. in DC., Monogr. Phan. 2: 540. 1879,



1—5.象头花 *Arisaema franchetianum* Engl.: 1.植株, 2.块茎, 3.幼叶, 4.雄性肉穗花序, 5.雄花。  
 6—7.白苞南星 *A. candidissimum* W. W. Smith: 6.佛焰花序, 7.雄性肉穗花序。8—9.螃蟹七 *A. fargesii* Buchet: 8.佛焰花序, 9.果序。10—11.瑞山南星 *A. sinii* Krause: 10.佛焰花序, 11.雌性肉穗花序。  
 (肖 溶绘)