

151 et 199. 1920 p. p.; Hara, Fl. E. Himal. ed. 2. 325. 1971.—Sect. *Trisecta* Schott, Prodr.: 25 et 27. 1860, pro minor part.—Sect. *Ringentia* Engl., l. c. 151 et 209.—Sect. *Colocasiarum* Nakai in Journ. Jap. Bot. 25: 6. 1950.—*Ringentiarum* Nakai l. c.

叶2或1, 叶片3裂, 稀5裂。肉穗花序雌雄异株; 药室裂孔椭圆形或圆形; 附属器圆柱形, 直立, 略伸出佛焰苞喉外, 顶端钝圆, 基部近截形。

34. 驴耳南星

Arisaema onoticum Buchet in Lect., Not. Syst. 1 (12): 374. 1911; Engl. in Engl., Pflanzenr. 73 (4, 23F): 201. 1920.

块茎近球形, 直径2—3厘米。鳞叶上部狭, 锐尖, 下部长鞘状, 上部的长20厘米。叶1—2, 叶柄长18—33厘米, 粗1.5—2.5厘米, 下部2/3具鞘, 鞘端截平; 叶片3全裂, 裂片具长1—2.5厘米的柄, 椭圆形或椭圆状披针形, 长9—11厘米, 宽约4厘米, 具细齿, 基部楔形, 对称, 先端渐尖, I级侧脉纤细, 与中肋几成直角, 集合脉清晰。花序柄与叶柄近等长, 略短或稍长, 粗2.5—3毫米。佛焰苞全长9—11厘米, 中部具白色条纹, 上半部褐紫色, 稀绿色, 管部苍白色, 漏斗状, 长约5厘米, 上部粗1.5—2厘米, 喉部边缘斜截形, 不反卷; 檐部直立, 驴耳状, 背部稍囊肿, 边缘深波状, 短渐尖。肉穗花序单性, 雄花序长2—3厘米, 长圆锥形, 花多而密; 附属器长2.2—5厘米, 直立, 具长5—8毫米的柄, 基部骤然增粗, 基底截形, 上部圆柱形或倒圆锥状圆柱形, 先端粗棒状, 稍伸出喉外, 远短于檐部, 雄花具短柄, 雄蕊3—4, 药室短椭圆状, 顶孔开裂, 药隔三角形。

我国特有, 产四川城口。模式未见。

35. 花南星(四川) 蛇芋头、大麦冬、狼毒(湖北鹤丰), 蛇磨芋、天南星(湖北均县、利川、恩施), 南星七、绿南星、白南星、半边莲、虎爪南星、狗爪南星(湖北巴东), 独脚莲(广西龙胜), 虎芋(贵州兴义), 麻芋子(四川天全), 血理箭(四川武隆), 大半夏、芋儿南星(四川北川), 蛇杵棒(四川宝兴), 黑南星(四川洪雅), 南星(四川广原), 虎掌(四川洪溪), 狗爪半夏(四川黑水), 蛇包谷(四川南川), 花包谷、红包谷、大麻芋子、烂屁股(四川峨眉)。

Arisaema lobatum Engl. in Engl., Bot. Jahrb. 1: 487. 1811; Franch., Pl. David. 2: 138. 1888; N. E. Brown in Journ. Linn. Soc. Bot. 36: 178. 1903; Engl. in Engl., Pflanzenr. 73 (4, 23F): 202, fig. 46. 1920.—*A. lobatum* var. *a. rosthornianum* Engl. in Engl., Bot. Jahrb. 29: 235. 1901, 36: 11. 1905, in Engl., Pflanzenr. 73 (4, 23F): 202. 1920; N. E. Brown in Journ. Linn. Soc. Bot. 36: 178. 1903; Krause in Fedde, Rep. Sp. Nov. 12: 314. 1922; Hand.-Mazt., Symb. Sin. 7: 1366. 1936.—*A. pictum* N. E. Brown in Journ. Linn. Soc. Bot. 29: 321. 1892.—*A. lobatum* var. *b. latisectum* Engl. in Engl., Pflanzenr. 73 (4, 23F): 202. 1920.