

3—7 毫米, 子房倒卵圆形, 柱头盘状, 扁平; 上部雄花序长 3—7 毫米, 雄花紧密排列, 雄蕊通常 2, 近无柄; 药室裂孔小, 圆形; 附属器极短的椭圆状, 长 2—5 毫米, 粗 1.5 毫米, 绿色或黄色, 干时具皱。果序圆球形, 直径 1.7 厘米, 具宿存的附属器; 浆果干时黄绿色, 倒卵圆形, 长 3—4 毫米, 顶部宽 3—5 毫米; 种子 3, 卵形或倒卵形, 浅黄色, 长 2—2.5 毫米。花期 5—6 月, 果期 7—10 月。

产西藏南部至东南部和四川西部、云南西北部, 海拔 2200—4400 米, 生于碎石坡或灌丛中, 为西藏地区常见的杂草, 荒地、田边、路旁以及庭院中也可见到。阿富汗、克什米尔地区、印度西北部、尼泊尔、不丹有分布。

块茎药用, 藏医用以退烧、杀菌、杀虫; 主治慢性支气管炎、支气管扩张、破伤风、口噤强直、小儿惊风、癫痫。

组 8. 鞭序组——Sect. *Flagellarisaema* (Nakai) Hara, Fl. E. Himal. ed. 2: 326. 1971.——Sect. *Tortuosa* Engl. in Engl., Pflanzenr. 73 (4, 23F): 185 pro minor part. 1920.——*Flagellarisaema* Nakai in Journ. Jap. Bot. 25: 6. 1950.

块茎近球形。叶 1, 稀 2, 鸟足状分裂。肉穗花序附属器鞭状, 下部较粗, 上部线形下垂。花药室孔圆形或长圆形。雌雄异株。

50. 旱生南星 图版 32: 4—6


Arisaema aridum H. Li, 植物分类学报 15 (2): 107, 图版 9: 4. 1977.

块茎近球形, 直径 1.5 厘米。鳞叶 2, 膜质, 线状披针形, 锐尖, 第一片长 2—3 厘米, 第二片长 5.5—10 厘米。叶 1, 叶柄长 10—18 厘米, 纤细, 下部 1/2 具狭鞘; 叶片鸟足状分裂, 裂片 5, 椭圆形, 锐尖, 基部楔形, 侧脉细弱, 斜伸, 集合脉距边缘 0.5—1.5 毫米, 中裂片具长 3 毫米的柄或近无柄, 长 4—5 厘米, 宽 1.4—2 厘米; 侧裂片具长 3 毫米共同的短柄, 长 3.5—4 厘米, 宽 0.8—1.4 厘米。花序柄略长于叶柄, 长 12—22 厘米, 纤细。佛焰苞绿色、黄绿色, 管部圆筒形, 长 2.5 厘米, 粗 8 毫米, 喉部斜截形, 无耳, 几不外卷; 檐部狭卵状披针形, 长渐尖, 长约 6 厘米, 宽 1.5—2 厘米。肉穗花序单性, 雄花序圆柱形, 长 1.5 厘米, 粗 2 毫米, 花疏, 雄花具短柄, 花药 2, 药室圆球形, 顶孔圆形; 附属器纤细, 无柄, 线形, 粗不及 1 毫米, 长 10—14 厘米, 由喉部水平外伸, 然后下垂。花期 6 月。

我国特有, 产四川稻城和云南中甸, 海拔 2250—2500 米, 生长于干旱河谷灌丛或石灰岩缝中。模式标本产自四川稻城县东义区。

组 9. 雪里见组——Sect. *Decipientia* Engl. in Engl., Pflanzenr. 73 (4, 23F): 195. 1920.

根茎圆柱形。叶 2, 叶片鸟足状分裂。佛焰苞檐部无耳, 具长尾。附属器具短柄, 基部较粗, 近截形, 直立, 先端钝圆或渐狭, 略伸出喉外。



1—3. 雪里见 *Arisaema rhizomatum* Fischer: 1. 植株, 2. 雄性肉穗花序, 3. 雌性肉穗花序。4—6. 旱生南星 *A. aridum* H. Li: 4. 植株, 5. 雄性肉穗花序, 6. 雄花。7—8. 奇异南星 *A. decipiens* Schott: 7. 植株, 8. 雌性肉穗花序。(肖 溶绘)