

植株高约1米,基部具棕褐色带网眼的纤维网。叶在茎下部的宽椭圆形,有时狭矩圆形,长约30厘米,宽(2—)5—10(—13)厘米,两面无毛,先端渐尖,基部收狭为柄,叶柄通常长5—10厘米。圆锥花序长而扩展,具多数近等长的侧生总状花序;总轴和枝轴生灰白色绵状毛;花被片伸展或反折,淡黄绿色、绿白色或褐色,近椭圆形或倒卵状椭圆形,长6—8毫米,宽2—3毫米,先端钝,基部无柄,全缘,外花被片背面至少在基部被毛;小苞片短于或近等长于花梗,背面生绵状毛,在侧生花序上的花梗长约6—8(—14)毫米;雄蕊长为花被片的2/3;子房卵状矩圆形。蒴果直立,长1.5—2厘米,宽约1厘米。花果期6—10月。

产江西、江苏、浙江、安徽、湖南、湖北、广东、广西和福建(上杭、建瓯)。生于海拔700—1350米的山坡林下阴湿处。

11. 狭叶藜芦 图版5: 1—3

Veratrum stenophyllum Diels in Notes Bot. Gard. Edinb. 5: 303. 1912; Loes. f. in Rep. Sp. Nov. Fedde 25: 3. 1928.——*V. yunnanense* Loes. f. in Verh. Bot. Ver. Brand. 68: 144 et 163. 1926.

植株高达1米许,茎基部有数枚浅白色或棕褐色的膜质鞘;鞘枯死后,成为带网眼的纤维网或至少在鞘端如此。叶在下部的(近基生)带状、狭矩圆形、倒披针形或有时近狭镰刀状,长约30厘米或更长,宽1.5—2.5(—8.5)厘米,先端锐尖,基部收窄为鞘,抱茎,两面无毛。圆锥花序具密集的花;侧生总状花序轴纤弱,通常着生雄性花,顶生总状花序生两性花;总轴和枝轴密生浅白色绵状毛,每一侧生花序基部有1枚长于或短于侧生花序的苞片;花被片淡黄绿色,近直立或平展,矩圆形或卵状矩圆形,通常长5—7毫米,宽3—4毫米,先端稍尖,基部收窄为短柄状,全缘,背面基部稍有毛,无明显可见的腺体;侧生花序上的花梗长(1—)2—3(—4)毫米,小苞片近等长于或长于花梗,背面生绵状毛;子房近矩圆形,无毛。蒴果直立,紧密而伏贴于花序主轴。花果期7—10月。

产云南(西北部)和四川(西部)。生于海拔2000—4000米的山坡草地上或林下阴处。根供药用,与蒙自藜芦同,但有大毒,宜慎用。

滇北藜芦(变种)

var. *taronense* Wang et Tsi, var. nov. in Addenda.

与狭叶藜芦之区别,在于叶背面脉上具乳突状毛,侧生总状花序短而纤弱,花较小。

产云南西北部(打拉)。生于海拔2900—3800米的山地林缘。

12. 蒙自藜芦 披麻草,小棕包 图版5: 4—9

Veratrum mengtzeanum Loes. f. in Verh. Bot. Ver. Brand. 68: 145. 1926; et in Rep. Sp. Nov. Fedde 25: 6. 1928.——*V. wilsonii* C. H. Wright ex Loes. f. in Verh. Bot. Ver. Brand. 68: 145. 1926.

植株高达1.3米,近基部粗0.7—1厘米,具棕褐色或浅白色的膜质鞘,鞘枯死后常在



1—3.狭叶藜芦 *Veratrum stenophyllum* Diels: 1.花序, 2.花, 3.果实; 4—9.蒙自藜芦 *V. mengtzeanum* Loes. f.: 4.植株下部, 5.花序, 6.花, 7.花被片和雄蕊, 8.果实, 9.种子。(张泰利绘)