

分种检索表

1. 叶近二列着生; 花小, 花被片长约 2 毫米(广东)……………5. 小花吊兰 *C. laxum* R. Br.
1. 叶簇生, 不为二列; 花较大, 花被片长在 7 毫米以上。
2. 花葶常变为匍枝, 近花序末端通常有叶簇或幼小植株; 花丝明显长于花药, 花药开裂后常多少卷曲(栽培植物)……………1. 吊兰 *C. comosum* (Thunb.) Baker
2. 花葶直立或稍外弯, 花序上不具叶簇或幼小植株; 花丝短于花药或近等长, 花药开裂后不卷曲。
3. 叶非禾状, 宽 7—50 毫米; 花至少一部分 2—3 朵簇生; 根稍肥厚, 但不为纺锤状。
4. 根状茎短或不明显, 根近簇生; 叶干后不变黑色; 花序一般分枝较少或不分枝(西藏、云南、四川)……………2. 西南吊兰 *C. nepalense* (Ldl.) Baker
4. 根状茎近直生, 粗而长, 直径 1—2 厘米, 节上散生有根; 叶干后变黑色; 花序常多分枝(云南)……………4. 大叶吊兰 *C. malayense* Ridley
3. 叶禾状, 宽 2—5 毫米; 花全部单生; 根肥厚, 至少有一部分近纺锤状(云南、四川)……………3. 狭叶吊兰 *C. chinense* Bur. et Franch.

1. 吊兰

Chlorophytum comosum (Thunb.) Baker in Journ. Linn. Soc. Bot. 15: 329. 1877.—*Anthericum comosum* Thunb., Prod. Pl. Cap. 63. 1772—1775.

根状茎短, 根稍肥厚。叶剑形, 绿色或有黄色条纹, 长 10—30 厘米, 宽 1—2 厘米, 向两端稍变狭。花葶比叶长, 有时长可达 50 厘米, 常变为匍枝而在近顶部具叶簇或幼小植株; 花白色, 常 2—4 朵簇生, 排成疏散的总状花序或圆锥花序; 花梗长 7—12 毫米, 关节位于中部至上部; 花被片长 7—10 毫米, 3 脉; 雄蕊稍短于花被片; 花药矩圆形, 长 1—1.5 毫米, 明显短于花丝, 开裂后常卷曲。蒴果三棱状扁球形, 长约 5 毫米, 宽约 8 毫米, 每室具种子 3—5 颗。花期 5 月, 果期 8 月。

原产非洲南部, 各地广泛栽培, 供观赏。广州民间取全草煎服, 治声音嘶哑。

除本种外, *C. capense* (L.) Druce 也常被栽培, 区别点是花葶通常直立, 具多分枝的圆锥花序, 花序末端不具叶簇或幼小植株。

Fl. Cape Penins. 185. 1950. 中用 Jacques 作为本种组合的作者, 但我们未查到原文献(可能为 *Manual Génér. Pl.*)。

2. 西南吊兰 图版 10: 1—3

Chlorophytum nepalense (Ldl.) Baker in Journ. Linn. Soc. Bot. 15: 320. 1877.—*Phalangium nepalensis* Ldl. in Trans Hort. Soc. 6: 277. 1826; et in Bot. Mag. t. 998. 1826.—*Chlorophytum khasianum* Hook. f., Fl. Brit. Ind. 6: 334. 1892.—*C. flaccidum* W. W. Sm. in Notes Bot. Gard. Edinb. 13: 156. 1921.—*C. mekongense* W. W. Sm., l. c.—*C. oreogenes* W. W. Sm., l. c., p. 157.

根状茎短, 不明显; 根稍粗厚, 粗约 1—2 毫米。叶形变化较大, 长条形、条状披针形至