

狭叶重楼(变种)

var. *stenophylla* Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris ser. 2. **10**: 97. 1888; 裴鉴和周太炎, 中国药用植物志 **7**: 图 305. 1964——*P. polyphylla* Sm. var. *brachystemon* Franch. in Journ. de Bot. **12**: 191. 1898. ——*P. arisanensis* Hay. Icon. Pl. Form. **9**: 141. 1920. ——*P. lancifolia* Hay. in Bot. Mag. Tokyo **2**: 52. 1906. ——*P. hamifer* Lévl. in Rep. Sp. Nov. Fedde **12**: 288. 1913.

叶 8—13 (—22) 枚轮生, 披针形、倒披针形或条状披针形, 有时略微弯曲呈镰刀状, 长 5.5—19 厘米, 通常宽 1.5—2.5 厘米, 很少为 3—8 毫米, 先端渐尖, 基部楔形, 具短叶柄。外轮花被片叶状, 5—7 枚, 狹披针形或卵状披针形, 长 3—8 厘米, 宽 (0.5—) 1—1.5 厘米, 先端渐尖头, 基部渐狭成短柄; 内轮花被片狭条形, 远比外轮花被片长; 雄蕊 7—14 枚, 花药长 5—8 毫米, 与花丝近等长; 药隔突出部分极短, 长 0.5—1 毫米; 子房近球形, 暗紫色, 花柱明显, 长 3—5 毫米, 顶端具 4—5 分枝。花期 6—8 月, 果期 9—10 月。

产四川、贵州、云南、西藏、广西、湖北、湖南、福建、台湾、江西、浙江、江苏、安徽、山西、陕西和甘肃。生于林下或草丛阴湿处, 海拔 1000—2700 米。锡金和不丹也有分布。

宽叶重楼(新变种)

var. *latifolia* Wang et Chang, var. nov.

本变种与狭叶重楼(变种)很近, 主要区别在于: 叶较宽, 通常为倒卵状披针形或宽披针形, 长 12—15 厘米, 宽 2—4 (—6) 厘米, 幼果外面有疣状突起, 成熟后更为明显。花期 5 月, 果期 7—9 月。

产山西、陕西(西部)、河南(西部)、甘肃(东部)和安徽(滁县)。生山坡林下, 海拔 1000—2300 米。

短梗重楼(变种) 图版 31: 4—5

var. *appendiculata* Hara, Fl. East. Himal. 410. 1966. ——*P. delavayi* Franch. in Journ. de Bot. **12**: 190. 1898; 裴鉴和周太炎, 中国药用植物志 **7**: 图 307. 1964. ——*P. henryi* Diels in Bot. Jahrb. **20**: 252. 1900. ——*P. bockiana* Diels, ibid. 253

叶 6—9 (—10) 枚轮生, 矩圆形或矩圆状披针形, 长 6—12 厘米, 宽 1.5—3 厘米, 先端短尖或渐尖, 基部楔形或近圆形; 叶柄长 1—2 厘米, 很少较短, 带紫色。花梗通常短于叶, 极少稍长于叶; 内轮花被片狭线形, 长约 1—1.5 厘米, 长为外轮的 1/2, 暗紫色或黄绿色; 雄蕊 6—10 枚, 长约 1—1.5 厘米, 花丝扁平, 长为花药的 1/5, 药隔突出部分长 1—3 (—5) 毫米。花期 5—6 月。