

形,长 2—5 毫米;花白色,直径约 3—4 毫米;花被片矩圆状卵形,长约 2 毫米;雄蕊具很短的花药。浆果直径 8—10 毫米,熟时红色,具 1—2 颗种子。

原产非洲南部,现已被广泛栽培。我国各地公园都很常见,供观赏。

D. C. Huttleston (Baileya **17**: 59. 1970) 把本种的栽培品种分为 cv. “Sprengeri” 和 cv. “Myers”。按照他的见解,前者叶状枝长 1.5—3.5 厘米,宽 1—2 毫米,茎上鳞片状叶的基部具长 5 毫米的刺,后者叶状枝长 1 厘米,宽约 1 毫米,鳞片状叶基部近无刺。我国常见的栽培品种应为前者。

2. 文竹

Asparagus setaceus (Kunth) Jessop in Bothalia **9**: 51. 1966; Hutt. in Baileya **17**: 59. 1970.——*Asparagopsis setacea* Kunth, Enum. Pl. **5**: 82. 1850.——*Asparagus plumosus* Baker in Journ Linn. Soc. Bot. **14**: 613. 1875; 侯宽昭等,广州植物志 676. 1956.

攀援植物,高可达几米。根稍肉质,细长。茎的分枝极多,分枝近平滑。叶状枝通常每 10—13 枚成簇,刚毛状,略具三稜,长 4—5 毫米;鳞片状叶基部稍具刺状距或距不明显。花通常每 1—3 (—4) 朵腋生,白色,有短梗;花被片长约 7 毫米。浆果直径约 6—7 毫米,熟时紫黑色,有 1—3 颗种子。

原产非洲南部,我国各地常见栽培

亚属 2. 天门冬亚属——Subgen. **Asparagus**

花单性,雌雄异株,或有时杂性。

组 1. 原始天门冬组——Sect. *Archiasparagus* Iljin in Kom., Fl. URSS **4**: 427. 1935.

叶状枝扁平,或由于中脉龙骨状而多少呈锐三稜形。

3. 羊齿天门冬(中药志) 滇百部、月牙一支蒿(云南),土百部、千锤打(四川)

图版 33 : 1—2

Asparagus filicinus Ham. ex D. Don, Prodr. Fl. Nepal. 49. 1825.——*A. filicinus* Ham. ex D. Don var. *giraldii* C. H. Wright in Gard. Chron. ser. 3, **44**: 122. 1908.——*A. filicinus* Ham. ex D. Don var. *megaphyllus* Wang et Tang, 静生汇报 **7**: 290. 1937.——*A. filicinus* Ham. ex D. Don var. *brevifolius* auct. non Baker: Diels in Bot. Jahrb. **29**: 245. 1900.