

## 1. 无毛粉条儿菜 图版 57: 1—3

**Aletris glabra** Bur. et Franch. in Journ. de Bot. **5**: 156. 1891, et **10**: 197. 1896. — *A. sikkimensis* Hook. f., Fl. Brit. Ind. **6**: 265. 1892. — *A. foliosa* Bur. et Franch. var. *sikkimensis* (Hook. f.) Franch. in Journ. de Bot. **10**: 198. 1896. — *Metanarthecium formosanum* Hay., Icon. Fl. Form **9**: 142. 1920. — *Aletris formosana* (Hay.) Makino et Nemoto, Fl. Jap. ed. 2, 1534. 1931.

植株具细长的纤维根。叶簇生，硬纸质，条形或条状披针形，常对折，有时下弯，长 5—25 厘米，宽 0.5—1.7 厘米，先端渐尖。花葶高 30—60 厘米，无毛，中下部有几枚长 1.5—5.5 厘米的苞片状叶；总状花序长 7—25 厘米，有粘性物质；花多，稍密生，下部的较稀疏；苞片 2 枚，条形或窄披针形，其中 1 枚位于花梗基部，比花长，另 1 枚位于花梗上部，很小；花梗长 1—3 毫米；花被坛状，无毛，黄绿色，长 4—7 毫米，上端约 1/3 处分裂；裂片长椭圆形，长 3—4 毫米，膜质，有 1 条明显的绿色中脉；雄蕊着生于花被裂片的基部；花丝短，花药卵形或近圆形，长 0.4 毫米。蒴果卵形，长 3—5 毫米，无毛。花期 5—6 月，果期 9—10 月。

产湖北、陕西(秦岭以南)、甘肃(南部)、四川、贵州(纳雍)、西藏、云南、福建和台湾。生林下、灌木丛中或草坡上，海拔 2000—4000 米。锡金也有分布。

## 2. 高山粉条儿菜 图版 57: 4—6


**Aletris alpestris** Diels in Bot. Jahrb. **36**. Beibl. **82**: 20. 1905. — *A. dielsii* Wang et Tang, 静生汇报 **7**: 83. 1936.

植株细弱，具细长的纤维根。叶近莲座状簇生，条状披针形，长 2.5—8 厘米，宽 2—4 毫米，先端渐尖。花葶高 7—20 厘米，直径 0.5—1 毫米，疏生柔毛，中下部有几枚苞片状叶；总状花序长 1—4 厘米，疏生 4—10 朵花；苞片 2 枚，披针形或卵状披针形，绿色，位于花梗的上部，长 1.5—3 毫米，短于花；花梗长 2—4 毫米；花被近钟形，无毛，白色，长 4—4.5 毫米，约分裂到中部；裂片披针形，长 2 毫米，宽 1 毫米，稍向外弯曲；雄蕊着生于裂片基部，花丝长 0.5 毫米，花药球形，长 0.2 毫米；子房卵形，突然收缩为短的花柱。蒴果球状卵形，长 2—3 毫米，无毛。花期 6 月，果期 8 月。

产陕西(太白山)、四川、贵州(赤水)和云南(丽江)。生岩石上或林下石壁上，海拔 800—3600 米。

## 3. 少花粉条儿菜 图版 57: 7—8

**Aletris pauciflora** (Klotz.) Franch. in Journ. de Bot. **10**: 202. 1896. — *Stachyopogon pauciflorus* Klotz. in Klotz. et Garcke, Bot. Erg. Reise Pr. Waldemar 49,



1—3. 无毛粉条儿菜 *Aletris glabra* Bur. et Franch., 1. 植株; 2. 花; 3. 花, 已剖开。4—6. 高山粉条儿菜 *A. alpestris* Diels, 4. 植株; 5. 花; 6. 花, 已剖开。7—8. 少花粉条儿菜 *A. pauciflora* (Klotz.) Franch. 7. 花; 8. 花, 已剖开。(王金凤绘)