

约 100 多种,分布于热带和亚热带地区;我国约有 1 种及 1 变种,分布于华南至西南各省区。

分种检索表

1. 花被裂片线形,宽一般不及 1 厘米,顶端渐狭;花被管伸直……………
 ……………1. 文殊兰 *C. asiaticum* L. var. *sinicum* (Roxb. ex Herb.) Baker
1. 花被裂片披针形或长圆状披针形,宽 1 厘米以上,顶端常骤然收狭成短渐尖;花被管常稍弯曲……………
 ……………2. 西南文殊兰 *C. latifolium* L.

1. 文殊兰(越南笔记) 文殊兰(广州植物志) 图版 2: 1—2

Crinum asiaticum* L. var. *sinicum (Roxb. ex Herb.) Baker, Handb. Amaryll.
 75. 1888; C. H. Wright in Journ. Linn. Soc. Bot. **36**: 88. 1903; Bailey, Man.
 Cult. Pl. print. 2, 253. 1954; 广州植物志 699. 1956; 中国高等植物图鉴 **5**: 551,
 图 7931. 1976; 海南植物志 **4**: 145, 图 1050. 1977. — *C. sinicum* Roxb. ex Herb.
 in Curtis's Bot. Mag. sub. **47**: t. 2121. 1820; Herb. Amaryll. 244. 1837; Maxim. in Bot.
 Jahrb. **6**: 77. 1885.

多年生粗壮草本。鳞茎长柱形。叶 20—30 枚,多列,带状披针形,长可达 1 米,宽 7—12 厘米或更宽,顶端渐尖,具 1 急尖的尖头,边缘波状,暗绿色。花茎直立,几与叶等长,伞形花序有花 10—24 朵,佛焰苞状总苞片披针形,长 6—10 厘米,膜质,小苞片狭线形,长 3—7 厘米;花梗长 0.5—2.5 厘米;花高脚碟状,芳香;花被管纤细,伸直,长 7—10 厘米,直径 1.5—2 毫米,绿白色,花被裂片线形,长 4.5—9 厘米,宽 6—9 毫米,向顶端渐狭,白色;雄蕊淡红色,花丝长 4—5 厘米,花药线形,顶端渐尖,长 1.5 厘米或更长;子房纺锤形,长不及 2 厘米。蒴果近球形,直径 3—5 厘米;通常种子 1 枚。花期夏季。


分布于福建、台湾、广东、广西等省区。常生于海滨地区或河旁沙地;现栽培供观赏。模式标本可能采自香港。

叶与鳞茎药用,有活血散瘀、消肿止痛之效,治跌打损伤、风热头痛、热毒疮肿等症。

2. 西南文殊兰 西南文殊兰(中国高等植物图鉴) 图版 2: 3

***Crinum latifolium* L. Sp. Pl. 291. 1753; Baker, Handb. Amaryll. 87. 1888; Merr. in Trans. Amer. Philos. Soc. **24** (2): 111. 1935; Hand.-Mazz. Symb. Sin. **7**: 1226. 1936; 中国高等植物图鉴 **5**: 551, 图 7932. 1976. — *C. ornatum*; Herb. var. *latifolium* Herb. Amaryll. 263. 1837.**

多年生粗壮草本。叶带形,长 70 厘米或更长,宽 3.5—6 厘米或更宽。伞形花序有花



1—2.文殊兰 *Crinum asiaticum* L. var. *sindicum* (Roxb. ex Herb.) Baker: 1.花序,2.叶。

3.西南文殊兰 *Crinum latifolium* L.: 花序。(陈荣道绘)