

x = 10、11、12、23、26、37。

本属后选模式种：水鬼蕉 *H. littoralis* (Jacq.) Salisb.

约 50 种，分布于美洲温暖地区。我国引种栽培的常见有 1 种。

1. 水鬼蕉(种子植物名称)

Hymenocallis littoralis (Jacq.) Salisb. in Trans. Hort. Soc. London **1**:338. 1812; Baker, Handb. Amaryll. 123. 1888.—*Pancratium littoralis* Jacq., Hort. Bot. Vind. 3:41, t. 75. 1776.—*H. americana* Roem. Amaryll. 176. 1851; Bailey, Man. Cult. Pl. print. 2, 256. 1954; 广州植物志 702. 1956.

叶 10—12 枚，剑形，长 45—75 厘米，宽 2.5—6 厘米，顶端急尖，基部渐狭，深绿色，多脉，无柄。花茎扁平，高 30—80 厘米；佛焰苞状总苞片长 5—8 厘米，基部极阔；花茎顶端生花 3—8 朵，白色；花被管纤细，长短不等，长者可达 10 厘米以上，花被裂片线形，通常短于花被管；杯状体(雄蕊杯)钟形或阔漏斗形，长约 2.5 厘米，有齿，花丝分离部分长 3—5 厘米；花柱约与雄蕊等长或更长。 花期夏末秋初。

原产美洲热带；我国引种栽培供观赏。

9. 朱顶红属——*Hippeastrum* Herb.

Herb. App. Bot. Reg. 31. 1821; Benth. et Hook. f. Gen. Pl. **3**:724.

1883; Pax. et Hoffm. in Engl. et Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2, **15a**:

415. 1930.

多年生草本。鳞茎大。叶线形或带形。花茎中空；伞形花序有花 2 至多朵，稀 1 朵，下有佛焰苞状总苞片 2 枚；每花之下具有小苞片 1 枚；花大，漏斗状，水平开展或稍下垂；花被管短，稀较长，喉部常有小鳞片，花被裂片几相等或内轮较狭，红色、白色或带有白色条纹；雄蕊着生于花被管喉部，稍下弯，花丝丝状，花药线形或线状长圆形，丁字形着生；子房 3 室，每室具多数胚珠，花柱较长，下垂，柱头头状或 3 裂。蒴果球形，室背 3 瓣开裂；种子通常扁平。

本属模式种：短筒朱顶红 *H. reginae* (L.) Herb.

约 75 种，分布于美洲和亚洲的热带；我国常引种栽培的有以下 2 种。

分种检索表

1. 花序有花 2—4 朵，花被裂片洋红色带绿…………… 1. 朱顶红 *H. rutilum* (Ker-Gawl.) Herb.
 1. 花序有花 3—6 朵，花被裂片红色，中心及边缘有白色条纹……………
 ……………… 2. 花朱顶红 *H. vittatum* (L'Her.) Herb.

朱顶红属 *Hippeastrum* Herb. 与孤挺花属 *Amaryllis* L. 两属的含义在国际上使用比