

斑点。叶剑形或条形，略弯曲，长15—40厘米，宽0.5—1.4厘米，黄绿色，中脉明显。花茎直立，上部有2—3个弯曲的分枝，下部有数枚叶；花无梗；每朵花基部有2枚膜质苞片，苞片宽卵形或卵圆形，顶端略凹或2尖头，长0.6—1厘米，宽约8毫米；花直立，淡黄色或黄绿色，有香味，直径2—3厘米；花被管喇叭形，长约4厘米，直径约1厘米，基部变细，花被裂片6，2轮排列，外轮花被裂片卵圆形或椭圆形，长1.8—2厘米，宽约6毫米，内轮较外轮花被裂片略短而狭；雄蕊3，着生于花被管上，长2—2.5厘米；花柱1，柱头6裂，子房绿色，近球形，直径约3毫米。蒴果近卵圆形，室背开裂。花期4—5月，果期6—9月。

原产非洲南部。我国南方各地多露天栽培，北方各地多盆栽，供观赏，花可提取香精。

7. 红葱属——*Eleutherine* Herb. nom. conserv.

Herb. in Bot. Reg. 29: t. 57. 1843.

多年生草本。鳞茎卵圆形或椭圆形，鳞片红色，肉质肥厚，无包被。叶基生，条形或披针形，数条纵脉平行而隆起，使叶表面形成明显的皱褶。花茎上部分枝，在分枝处生有条形或披针形的苞片，无茎生叶；多花组成伞形或伞房状的聚伞花序；花白色或粉红色；无明显的花被管，花被片6，2轮排列，内、外轮花被片近于等大，倒卵形或倒披针形；雄蕊3，着生在花被裂片的基本部，花丝短，花药条形；花柱顶端3裂，子房下位，长圆形，3室，胚珠多数。蒴果椭圆形，成熟时3裂。

本属的模式种：鳞茎红葱 *Eleutherine bulbosa* (P. Mill.) Urban.

全世界约4种，其中2种分布于越南、老挝、柬埔寨，2种分布于美洲。我国南方栽培1种，并逸为半野生。

1. 红葱(云南中草药选) 小红蒜(云南) 图版41: 5—6。

Eleutherine plicata Herb. in Bot. Reg. 29: t. 57. 1843; Makino et Nemoto, Fl. Jap. ed. 2, 1589. 1931.

多年生草本。鳞茎卵圆形，直径约2.5厘米，鳞片肥厚，紫红色，无膜质包被。根柔嫩，黄褐色。叶宽披针形或宽条形，长25—40厘米，宽1.2—2厘米，基部楔形，顶端渐尖，4—5条纵脉平行而突出，使叶表面呈现明显的皱褶。花茎高30—42厘米，上部有3—5个分枝，分枝处生有叶状的苞片，苞片长8—12厘米，宽5—7毫米；伞形花序状的聚伞花序生于花茎的顶端；花下苞片2，卵圆形，膜质；花白色，无明显的花被管，花被片6，2轮排列，内、外花被片近于等大，倒披针形；雄蕊3，花药“丁”字形着生，花丝着生于花被片的基本部；花柱顶端3裂，子房长椭圆形，3室。花期6月。

原产西印度群岛。云南各地常见栽培，并常逸为半野生。

为民间草药，对治疗心悸、头晕、外伤出血、痢疾等有效。



1—2. 虎皮花 *Tigridia pavonia* (L. f.) Ker-Gawl.: 1. 花枝, 2. 果实。3—4. 香雪兰 *Freesia refracta* Klatt: 3. 球茎, 4. 带花枝植株上部。5—6. 红葱 *Eleutherine plicata* Herb.: 5. 鳞茎, 6. 花枝。(于振洲、赵毓棠绘)