

裂,基部具瓣柄;花丝长5厘米,花药干时弯曲,长7—8毫米;子房被绢毛,长2.5—3毫米。蒴果球形,直径2厘米;种子红色。花期:6—8月;果期:10月。

产我国西藏(墨脱)、云南南部、广西;生于林中。印度、斯里兰卡亦有分布;欧洲有栽培。

本种花极美丽,可栽培供观赏。

11. 密花姜花(植物分类学报)

Hedychium densiflorum Wall. in Kew Journ. Bot. 5: 368. 1853; Bak. in Hook. f., Fl. Brit. Ind. 6: 227. 1892. p. p.; K. Schum. in Engl. Pflanzenr. 20 (IV. 46): 49. 1904. p. p.; 吴德邻等, 植物分类学报 16 (3): 27. 1978.

茎高1—1.2米。叶片长圆状披针形,长12—35厘米,宽3—10厘米,顶端尾尖,基部渐狭,两面均无毛,无柄至有长约1厘米的柄;叶舌钝,长约1厘米。穗状花序密生多花,长10—18厘米,宽约3厘米;苞片长圆形,长约2厘米,内生1(—2)花;花小,淡黄色,花萼较苞片略长,长约2.5厘米;花冠管长2.5—3厘米,裂片线形,长1.5厘米,反折;侧生退化雄蕊披针形,长约2厘米;唇瓣楔形,长约16毫米,宽约6毫米,深2裂;雄蕊较唇瓣略长,花药长8毫米。花期:7月。

产我国西藏(波密、易贡)。生于山坡林下,海拔2,100—2,300米。尼泊尔亦有分布。

12. 小花姜花(中国高等植物图鉴)

Hedychium sino-aureum Stapf in Kew Bull. 1925: 432. 1925; Hand.-Mazz., Symb. Sin. 7: 1319. 1936; 中国科学院植物研究所编, 中国高等植物图鉴 5: 584, 图7998. 1976.——*H. densiflorum* auct. non Wall.; Bak. in Hook. f., Fl. Brit. Ind. 6: 227. 1892. p. p.; K. Schum. in Engl. Pflanzenr. 20 (IV. 46): 49. 1904. p. p.

茎高60—90厘米。叶片披针形,长15—35厘米,宽3—6厘米,顶端具尾状细尖头,基部渐狭,两面均无毛;无柄至有长1.5厘米的柄;叶舌膜质,长0.5—1厘米。穗状花序密生多花,长10—20厘米,宽3—3.5厘米;苞片长圆形,包卷住萼管,长1.3—1.5厘米,内生单花,花小,黄色;萼管较苞片略长,顶端具钝3齿;花冠管长1.3—1.5厘米;花冠裂片线形,长8—11毫米;侧生退化雄蕊斜披针形,长8毫米;唇瓣近圆形,长约1厘米,2裂,基部具瓣柄;花丝长约1厘米,花药长5—6毫米。花期:7—8月。

产云南、西藏;生于海拔1,900—2,800米的空旷石头山上。锡金亦有分布。模式标本采自云南大理。

13. 小苞姜花(植物分类学报) 图版9: 2—3

Hedychium parvibracteatum T. L. Wu & Senjen, 植物分类学报 16 (3): 27. 图3. 1978.

株高50厘米。叶片长圆形,长15—17厘米,宽约4厘米,顶端渐尖,基部渐狭,两面