

月。

产云南、贵州、四川、西藏；生于海拔1200—2900米的山地密林中。尼泊尔亦有分布。

种子供药用，性辛微苦，能宽中理气，消胸膈膨胀，开胃消宿食。（见《滇南本草》）

15a. 疏花草果药（新拟）

var. **acuminatum** Wall. in Kew Journ. Bot. 5: 328. 1853; Bak. in Hook. f., Fl. Brit. Ind. 6: 227. 1892; K. Schum. in Engl. Pflanzenr. 20 (IV. 46): 50. 1904. — *H. acuminatum* Rosc., Mon. Pl. t. 47. 1828; Hook. f. in Bot. Mag. 57. t. 2969. 1830; Hand.-Mazz., Symb. Sin. 7: 1320. 1936.

本种和草果药不同之处在于花序上的花较少，排列稀疏，花冠管的顶部、花冠裂片、侧生退化雄蕊及唇瓣的基部紫红色。花期：8—10月。

产云南、西藏；生于林中，海拔2000—3200米。尼泊尔亦有分布。

2. 大苞姜属——*Caulokaempferia* K. Larsen

K. Larsen in Bot. Tidssk. 60: 165. 1964; K. Larsen & R.

M. Smith in Not. R. B. G. Edinb. 31 (2): 287. 1972.

多年生草本，具明显的地上茎。叶茎生，无柄或具短柄；叶舌小，2裂。花序顶生，苞片显著，1—10枚，2列，披针形，离生或基部与花序轴贴生呈囊状，上部延伸成叶片状，每一苞片内有花1—4朵，具小苞片或无；花萼管状，通常2—3齿裂；花冠管狭长，口部变宽，裂片3枚，后方的1枚稍较大；侧生退化雄蕊花瓣状；唇瓣大，近圆形，全缘或2裂，略内凹；花丝极短或无，花药基着，药室平行，纵裂，花药隔顶端附属体全缘；腺体线形，离生；子房3室。果为蒴果。

模式种：*M. linearis* Wall.

10种，分布于锡金、印度、泰国。我国有2种，产西南部至南部。

本属中有些种类曾置于 *Monolophus* Wall. 属内，该属名最初发表时只是在 *Kaempferia elegans* Wall. 的种下讨论时提及，后经 Endlicher (in Gen. Pl. 225. n. 1636. 1837.) 合法发表，但其模式种 *Monolophus elegans* Wall. 现已确认为 *Kaempferia* 属植物，故 Larsen 另起一新名为本属属名。

大苞姜属分种检索表

1. 叶片披针形，长5—14厘米，宽1—2厘米；苞片披针形，长3—5厘米，基部不与花序轴贴生…………… 1. 黄花大苞姜 *C. coenobialis* (Hance) K. Larsen
1. 叶片长圆形、长圆状披针形或卵形，长8—20厘米，宽4—5厘米；苞片基部边缘与花序轴贴生成囊状，上部叶状…………… 2. 大苞姜 *C. yunnanensis* (Gagnep.) R. M. Smith