

半圆形,长约3毫米;花柱线形,柱头具缘毛;子房卵形,长3.5毫米。花期:5—6月。

产云南、广西、广东、福建;野生于林下、荒坡或栽培。印度、锡金亦有分布。

块茎能活血散瘀,消肿止痛,主治跌打损伤,风湿骨痛。

6. 凹唇姜属——*Boesenbergia* O. Ktze.

O. Ktze., Rev. Gen. 2: 685. 1891; R. Schlecht. in Fedd. Rep. Sp. Nov. 12: 315—317. 1913; Loes. in Engl. & Prantl, Nat. Pflanzenfam. ed. 2. 15a: 568, 1930; Holttum in Gard. Bull. Sing. 13: 115. 1950; Back. et al., Fl. Java 3: 68. 1968.——*Gastrochilus* Wall., Pl. As. Rar. 1: 22. 1830. emend. Valt. in Jard. Bull. Buitenz. ser. 2. 27: 83. 1918, non D. Don. 1825.——*Kaempferia* K. Schum. et Auctorum p. p.

多年生草本;根茎块状或延长,根常膨大。叶基生或茎生;叶片披针形或长圆形,或卵形。穗状花序通常顶生,藏于顶部的叶鞘内或单独生于花葶上;苞片多数,2列,小苞片1枚;花萼管短,佛焰苞状;花冠管突出,细长,裂片近相等;侧生退化雄蕊花瓣状,通常较花冠裂片为宽;唇瓣较花冠裂片为大,倒卵形或宽长圆形,通常内凹呈瓢状,全缘或顶端2裂,边缘皱波状,基部变狭,有槽;花丝长或短,直立;花药室平行,缝裂或孔裂,具药隔附属体或无,基部无距;花柱线形,柱头漏斗状;子房3室(或不完全的3室),胚珠少数或多数,基生或生于中轴胎座上。蒴果长圆形,3瓣裂;种子基部具撕裂状假种皮。

模式种: *B. pulcherrima* (Wall.) O. Ktze.

约50种,分布于印度、马来西亚至菲律宾。我国有2种,产云南。

凹唇姜属分种检索表

1. 叶片基部渐尖至近圆形;花序由顶部叶鞘内长出……………1. 凹唇姜 *B. rotunda* (L.) Mansf.
1. 叶片基部心形;花序单独由根茎生出……………2. 心叶凹唇姜 *B. fallax* Loes.

1. 凹唇姜(新拟) 图版15

Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. in Kulturpfl. 6: 239. 1958; B. L. Burtt & R. M. Smith in Not. R. B. G. Edinb. 31 (2): 184. 1927.——*Curcuma rotunda* L., Sp. Pl. 2. 1753; Lour., Fl. Cochinch. 9. 1790.——*Kaempferia pandurata* Roxb. in Asiat. Res. 11: 328. t. 2. 1810; Rosc., Monandr. Pl. t. 96. 1828; Bak. in Hook. f., Fl. Brit. Ind. 6: 220. 1896; K. Schum. in Engl. Pflanzenr. 20 (IV. 46): 82. 1904; C. H. Wright in Journ. Linn. Soc. Bot. 36: 69. 1903.——*Boesenbergia pandurata* (Roxb.) Schlecht. in Fedd. Rep. Sp. nov. 12: 316. 1913; Holttum in Gard. Bull. Sing. 13: 115. 1950; Bak. et al., Fl.