

模式种: *G. marantina* L.

全世界有 100 种以上,分布于印度、马来西亚、菲律宾至新几内亚;我国有 3 种及 1 变种,产西南部至南部;此外还有 1 种 *G. mairei* Lévl. 因原记载含糊不清,故未收入本志。

舞花姜属分种检索表

1. 花药两边无翅状附属体;苞片较小,早落,腋内无珠芽;……………1. 舞花姜 *G. racemosa* Smith
1. 花药两边有 2 翅状的附属体;苞片较大,宿存,腋内有珠芽。
 2. 叶两面无毛。
 3. 花序上部有分枝,有 2—多朵正常发育的花;珠芽卵形……………2. 双翅舞花姜 *G. schomburgkii* Hook. f.
 3. 花序不分枝,较短,花几乎全部退化,而仅有小球形的珠芽……………2a. 小珠舞花姜 *G. schomburgkii* Hook. f. var. *angustata* Gagnep.
 2. 叶两面被毛……………3. 毛舞花姜 *G. barthei* Gagnep.

1. 舞花姜(中国高等植物图鉴) 图版 20: 4

Globba racemosa Smith, *Exot. Bot.* 2: 115. t. 117. 1804; Bak. in Hook. f., *Fl. Brit. Ind.* 6: 201. 1890; K. Schum. in *Engl. Pflanzenr.* 20 (IV. 46): 135. 1904.—*G. orixensis* Roxb. var. *racemosa* (Smith) Gagnep. in *Bull. Soc. Bot. France* 48: 201. 1901; *Hand.-Mazz., Symb. Sin.* 7: 1322. 1936.—*G. bulbosa* Gagnep. l. c. 202; K. Schum. l. c. 137.—syn. nov.—*G. strigulosa* K. Schum. l. c.—syn. nov.

株高 0.6—1 米;茎基膨大。叶片长圆形或卵状披针形,长 12—20 厘米,宽 4—5 厘米,顶端尾尖,基部急尖,叶片二面的脉上疏被柔毛或无毛,无柄或具短柄;叶舌及叶鞘口具缘毛。圆锥花序顶生,长 15—20 厘米,苞片早落,小苞片长约 2 毫米;花黄色,各部均具橙色腺点;花萼管漏斗形,长 4—5 毫米,顶端具 3 齿;花冠管长约 1 厘米,裂片反折,长约 5 毫米;侧生退化雄蕊披针形,与花冠裂片等长;唇瓣倒楔形,长约 7 毫米,顶端 2 裂,反折,生于花丝基部稍上处,花丝长 10—12 毫米,花药长 4 毫米,两侧无翅状附属体。蒴果椭圆形,直径约 1 厘米,无疣状凸起。花期: 6—9 月。

产我国南部至西南部各省区;生于林下荫湿处,海拔 400—1,300 米。印度亦有分布。

2. 双翅舞花姜(新拟)

Globba schomburgkii Hook. f. in *Bot. Mag.* t. 6298. 1876; K. Schum. in *Engl. Pflanzenr.* 20 (IV. 46): 153. fig. 21. 1904; Gagnep. in *Lécomte, Fl. Gén. Indo-Chine* 6: 38. 1908.—*G. chinensis* K. Schum. in *Engl. Pflanzenr.* 20 (IV. 46): 153. 1904.—syn. nov

株高 30—50 厘米。叶片 5—6 枚,椭圆状披针形,长 15—20 厘米,宽 3—4.5 厘米,无毛,顶端尾状渐尖,基部钝;叶柄长约 5 毫米;叶舌短。圆锥花序长 5—11 厘米,下垂,上



1—3.毛舞花姜 *Globba barthei* Gagnep. 1.植株顶部； 2.花； 3.雄蕊；
4.舞花姜 *G. racemosa* Smith 花。(黄少容绘)

部有分枝，分枝长1—2.5厘米，疏离，有2—多花，下部无分枝，而在苞片内仅有珠芽；苞片披针形，长6—12毫米；珠芽卵形，表面疣状，直径2—4毫米。花黄色，小花梗极短；萼钟状，长4—5毫米，具3齿；花冠管长8—10毫米，被短柔毛，裂片卵形；侧生退化雄蕊披针形，镰状弯曲；唇瓣狭楔形，黄色，顶端2裂，基部具橙红色的斑点；花丝长1厘米，弯曲，花药每边有2个三角形、翅状附属体；子房具疣点。 花期：8—9月。

产我国云南南部，生于林中阴湿处。中南半岛亦有分布。

2a. 小珠舞花姜(新拟)