

产广西。越南亦有分布。

果实用于开胃、行气。民间有少量栽培，取根茎作调味香料。

7. 光叶山姜(植物分类学报)

Alpinia intermedia Gagnep. in Bull. Soc. France 48: LXXXIII. 1901; K. Schum. in Engl. Pflanzenr. 20 (IV. 46): 317. 1904; 正宗严敬, 最新台湾植物总目录 279. 1936; Kitamura in Bot. Mag. Tokyo 59: 38. 1946; 大井次三郎, 日本植物志 335. 1935.—*A. oblongifolia* Hayata, Ic. Pl. Formos. 5: 215. 1915.—*A. kelungensis* Hayata, l. c. 216.—*A. hokutensis* Hayata, l. c. 9: 120. 1920.—*Languas hokutensis* (Hayata) Sasaki in Trans. Nat. His. Soc. Formos. 14: 84. 1924.—*L. kelungensis* (Hayata) Sasaki, l. c. 85.—*L. oblongifolia* (Hayata) Sasaki, l. c. 85. et 18: 175. 1928.

株高约1米。叶片长圆形或披针形, 长20—50厘米, 宽5—12厘米, 顶端渐尖, 基部渐狭, 两面均无毛; 叶柄长达2.5厘米; 叶舌长5—6毫米, 干膜质, 仅具缘毛。圆锥花序长10—15厘米, 宽2—4厘米, 直立或下垂, 无毛; 分枝长8—13毫米, 每一分枝的顶端有花3—4朵聚生; 苞片与小苞片相似, 长7—10毫米, 早落; 花白色, 花萼筒状, 无毛, 顶端具圆齿; 花冠管较萼管为短, 花冠裂片近相等, 无毛; 侧生退化雄蕊角状; 唇瓣卵形, 长1.8厘米, 顶端急尖, 短2裂, 基部渐狭成瓣柄; 花药卵形, 被小柔毛; 腺体棒状, 顶端钝。花期: 6月。

产我国台湾、广东(饶平); 生于山地灌丛中。日本(琉球)亦有分布。

8. 华山姜 图版23: 3

Alpinia chinensis (Retz.) Rosc. in Trans. Linn. Soc. 8: 346. 1807; K. Schum. in Engl. Pflanzenr. 20 (IV. 46): 317. 1904; Gagnep. in Lecomte, Fl. Gén. Indo-Chine 6: 91. 1908; B. L. Burtt & R. M. Smith in Not. R. B. G. Edinb. 31 (2): 200. 1972; 中国科学院植物研究所编, 中国高等植物图鉴 5: 594. 图8018. 1976.—*Heritiera chinensis* Retz., Obs. Bot. 6: 18. 1791.—*Alpinia suishanensis* Hayata, Ic. Pl. Formos. 9: 123. 1919.—*Languas chinensis* (Rosc.) Merr. in Lingnaam Agr. Rev. 1 (2): 64. 1923, et in Lingnan Sci. Journ. 5: 51. 1927.—*L. suishanensis* (Hayata) Sasaki in Trans. Nat. His. Soc. Formos. 18: 175. 1928.

株高约1米。叶披针形或卵状披针形, 长20—30厘米, 宽3—10厘米, 顶端渐尖或尾状渐尖, 基部渐狭, 两面均无毛; 叶柄长约5毫米; 叶舌膜质, 长4—10毫米, 2裂, 具缘毛。花组成狭圆锥花序, 长15—30厘米, 分枝短, 长3—10毫米, 其上有花2—4朵; 小苞片长1—3毫米, 花时脱落; 花白色, 萼管状, 长5毫米, 顶端具3齿; 花冠管略超出, 花冠裂片长圆形, 长约6毫米, 后方的1枚稍较大, 兜状; 唇瓣卵形, 长6—7毫米, 顶端微凹, 侧生