

冠白色，被绢毛，管长1厘米，裂片长圆状披针形，长2.5—3厘米；唇瓣卵形，长3.5厘米，黄色，具红色彩纹，基部两侧具瘤及粗硬毛；无侧生退化雄蕊；雄蕊长2.4厘米，无药隔附属体；蜜腺2，平坦，长2毫米；子房被长柔毛。蒴果球形，直径约2厘米，黄色，不规则开裂。花期：春。

产西藏、云南（西双版纳）、广东（栽培）。印度、孟加拉、缅甸亦有分布。

30. 疏花山姜（植物分类学报）

Alpinia mesanthera Hayata, Ic. Pl. Formos. 5: 225. 1915.

株高1—2米。叶片线状披针形，长60厘米，宽10厘米，顶端渐尖，基部楔状急尖，除边缘被丝质长柔毛外，两面均无毛；无叶柄；叶舌顶端圆形，外面及边缘被粗毛。总状花序直立，长27厘米，总花梗被粗毛；花疏离（间距1—3厘米）；小花梗与花序轴呈直角展开；小苞片膨大，长2.2厘米，宽1.7厘米（摊开量3厘米），一侧开裂，顶端具2—3裂片，无毛；花萼圆柱形，长2厘米，顶端3裂，复又一侧开裂，外面基部被小粗毛，顶端具缘毛；花冠管略呈圆柱形，长1.3厘米，外无毛，后方的1枚花冠裂片倒卵形，长3厘米，宽2.5厘米，顶端微凹或2裂，具缘毛，侧裂片较狭，长圆状匙形，侧生退化雄蕊疣状，被粗毛；唇瓣圆形，直径3厘米，顶端2裂，边缘具锯齿，面上基部有鸡冠状小疣点；花丝长1厘米，花药长1厘米，顶端钝，倒箭头形；子房长圆形，长13毫米，密被糙伏毛状的长柔毛。花期：7月。

产我国台湾。模式标本采自台湾角板山。

标本未见，以上描述据原记载改写。

31. 密毛山姜（植物分类学报） 川上氏月桃（台湾植物志）

Alpinia coplandii Ridl. in Philip. Journ. Sci. 4: 184. 1909; C. T. Moo in Fl. Taiwan 5: 832. 1978.—*A. kawakamii* Hayata, Ic. Pl. Formos. 5. 222. 1915, 9: 121. 1920.—*A. elwesii* Turr. in Bot. Mag. t. 8651. 1916; Hayata, I. C. 9:120.—*Languas kawakamii* (Hayata) Sasaki in Trans. Nat. His. Formos. 14: 85. 1924.

株高1.5米。叶片线状披针形，长约45厘米，宽5.5厘米，顶端尾状渐尖，基部渐狭，叶面无毛，叶背密被小柔毛；近无柄；叶舌2裂，长4毫米，背面被小柔毛；叶鞘被小柔毛，具明显的纵线条。总状花序长12—15厘米，花序轴被绒毛，小花梗长仅1毫米，被绒毛；小苞片倒卵形，长1.2厘米，宽7毫米，背面被短柔毛并具缘毛；花萼长1厘米，一侧开裂，外面密被短柔毛并具缘毛；花冠白色，管长1厘米，无毛，花冠裂片具缘毛，两侧的椭圆状披针形，长1.8厘米，宽7毫米，后方的一枚较宽；侧生退化雄蕊极短；唇瓣卵形，长2.2厘米，宽1.6—1.7厘米，顶端微凹，白色而染红；雄蕊长1.7厘米，花丝长7毫米，宽2毫米；蜜腺圆柱形，一面臌起，长2.5毫米，背面纵裂；花柱长3厘米，上部稍被短柔毛。子房卵圆形，径约2.5毫米，密被绒毛。果球形，被毛，直径12毫米；种子黑色，被膜质假种皮。

产我国台湾南部山地，海拔400—900米。菲律宾亦有分布。