

株高 1—2 米。叶片线状披针形，长 25—70 厘米，宽 4—7 厘米，顶端短渐尖，基部渐狭，边缘被粗毛，两面无毛；叶具短柄或近无柄；叶舌长圆形，边缘被粗毛。穗状花序长 12—15 厘米，宽约 5 厘米，花序轴被丝质长柔毛，花极稠密；小花梗近于无；小苞片倒卵形，长 15 毫米；花萼近圆柱形，长 18 毫米，顶端具 3 齿，复又一侧开裂，外被粗毛；花冠管长 8 毫米，花冠裂片具缘毛，后方的一枚近圆形，长约 1.8 厘米，两侧的较狭；唇瓣圆形，长与宽约 1.6 厘米，边缘具啮蚀状齿，基部具 2 痕状体；花药长 8 毫米，顶端 2 裂；子房短圆柱形，密被长柔毛，长 3.5 毫米。果球形，径 13 毫米，被小粗毛，顶端有宿萼，基部无宿存的小苞片。花期：5 月；果期：7 月。

产我国台湾（台北、宜兰、新竹、高雄）。模式标本采自台湾。

### 35. 菱唇山姜（植物分类学报）

*Alpinia kusshakuensis* Hayata, Ic. Pl. Formos. 9: 121. 1920.—*Languas kusshakuensis* (Hayata) Sasaki in Trans. Nat. His. Soc. Formos. 14: 85. 1924.

叶片披针形，长 50 厘米，宽 10 厘米，顶端突然渐尖，基部渐狭，除边缘被毛外，两面均无毛，具短柄或无柄；叶舌 2 裂，长 8 毫米，外被柔毛。穗序花序长 15 厘米，密生多花，密被长柔毛；小苞片壳状，长 2.5—3 厘米，小花梗极短或近于无；花萼长 2 厘米，顶端及边缘稍被毛，一侧开裂至中部，背面被粗毛；花冠管长 1 厘米，裂片长 3—5 厘米，后方的一枚倒卵状匙形，宽 1.2 厘米，侧生退化雄蕊长 4—5 毫米；唇瓣卵状菱形，长 4—4.5 厘米，宽 3 厘米，顶端尾尖，不裂，边缘黄色，中部以上中央红色，边缘具啮蚀状齿，喉部被粗毛；雄蕊长 4 毫米，基部与唇瓣及花冠裂片连合，花药线形，长 1.5 厘米，花柱无毛，柱头漏斗状，被粗毛；子房密被长柔毛，长 1 厘米。花期：5 月。

产我国台湾（台北）。模式标本采自台湾台北。

本种在《台湾植物志》中列为 *A. uraiensis* Hayata 的异名，编者因未见标本，暂按原始记载记述在此。

### 36. 紫纹山姜（植物分类学报） 长穗月桃（台湾植物志）

*Alpinia dolichocephala* Hayata, Ic. Pl. Formos. 9: 119. 1920.

叶片披针形，长 70—90 厘米，宽 10—12 厘米，顶端具长 1 厘米的尾状尖头，基部突然渐狭，边缘具极短的粗毛，两面均无毛，近无柄；叶舌不裂或近 2 裂，外被长柔毛。穗状花序有花部分长 15 厘米，被污黄色丝质长柔毛；小苞片近壳状，长 3 厘米，顶端近圆形，中央有一条长 1—2 毫米的芒状毛，边缘及基部被粗毛；小花无柄；花萼近圆柱形，长约 2 厘米，一侧开裂，外被极短的粗毛；花冠管长 1 厘米，后方的一枚花冠裂片兜状，长 2 厘米，顶端具小尖头，上部边缘具粗毛；无侧生退化雄蕊；唇瓣宽卵形，长和宽约 4 厘米，顶端 2 裂，边缘具啮蚀状齿，喉部无毛，白色，向上至中部具紫色条纹；花丝无毛，花药长 1 厘米；子房近球形，宽约 2 毫米。果序长 20—30 厘米；果球形，直径 1.5 厘米，被极短的粗毛。花期：4 月。产我国台湾。生于海拔 400—700 米的林下。模式标本采自台湾。