

产云南(西双版纳); 生于石灰岩上, 海拔 1,000 米。缅甸亦有分布。

2. 短柄直唇姜(新拟) 图版 35

Pommereschea spectabilis (King & Prain) K. Schum. in Engl. Pflanzenr. 20 (IV. 46): 280, fig. 36. 1904. — **Groftia spectabilis** King & Prain in Journ. Asiat. Soc. Bengal 65: 297. t. 5. 1899.

茎纤细, 单生, 高 17—25 厘米。叶片长圆形或长圆状披针形, 长 7—16 厘米, 宽 3—5 厘米, 顶端尾尖, 基部心形, 裂片相互靠叠, 两面均无毛; 叶柄长 0.5—2 厘米; 叶舌 2 裂, 长 5 毫米。穗状花序顶生, 长 5—7 厘米; 苞片披针形, 长 1.5—2 厘米; 小苞片线形, 长 5 毫米; 花萼棒状, 长 7 毫米, 黄色而有红点; 花冠管黄色, 长 1.2 厘米, 外被长柔毛, 裂片卵状披针形, 长 8 毫米; 唇瓣直立, 狭匙形, 长 8—9 毫米; 花丝长 1.5—2.5 厘米, 花药长 5 毫米; 子房椭圆形, 长 4 毫米, 被长柔毛。蒴果椭圆形, 长 8—9 毫米, 宽约 6 毫米, 被粗毛; 种子长 3 毫米, 基部具膜质假种皮。花期: 6—8 月。

产云南(西双版纳); 生于山地林下荫湿处, 海拔 1200 米。缅甸亦有分布。

13. 喙花姜属——**Rhynchanthus** Hook. f.

Hook. f. in Bot. Mag. t. 6861. 1886; Bak. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. 6: 257. 1892; K. Schum. in Engl. Pflanzenr. 20 (IV. 46): 376. 1904.

多年生草本, 具块状根茎。叶茎生, 无柄。穗状花序顶生, 少花; 苞片有颜色; 小苞片小; 萼管状, 上部一侧开裂, 顶端具小尖头; 花冠管漏斗状, 裂片 3, 直立, 披针形, 后方的 1 枚稍较大, 无侧生退化雄蕊; 唇瓣退化成小尖齿状, 位于花丝的基部或无; 花丝延长, 突出于花冠之外呈舟状, 顶端喙状; 花药室平行, 无距; 药隔无附属体; 花柱线形, 柱头陀螺状; 腺体近纺锤状, 2 枚。子房 3 室, 胚珠多数, 叠生, 中轴胎座。

模式种: **R. longiflorus** Hook. f.

6 种, 分布于亚洲的热带、亚热带地区; 我国云南有 1 种。

1. 喙花姜(中国高等植物图鉴) 图版 36

Rhynchanthus beesianus W. W. Smith in Not. R. B. G. Edinb. 10: 189. 1918; Hand.-Mazz., Symb. Sin. 7: 1322. 1936.

株高 0.5—1.5 米, 具肉质、增厚的根茎, 须根粗, 密被茸毛; 茎中部以下被张开的鳞片状鞘。叶片 3—6 枚, 椭圆状长圆形, 长 1.5—3 厘米, 宽 4.5—9 厘米, 顶端尾状渐尖, 基部圆形或急尖, 两面均无毛, 干时边缘褐色; 叶柄极短, 长约 4 毫米, 内面红色; 叶舌膜质, 长约 2 毫米, 鞘部张开, 具紫色斑纹。穗状花序顶生, 长 10—15 厘米, 直立, 有花约 12 朵, 花序柄短; 苞片线状披针形, 长 3—7 厘米, 鲜时红色, 干时紫红色, 薄膜质; 花萼管长约 3 厘米, 红色, 上部一侧开裂, 顶端具 2 个绿色的小尖头; 花冠管长 2—4.5 厘米, 红色, 上