

根茎块状，内部淡黄色；株高0.6—2米。叶片披针形至长圆状披针形，长15—40厘米，宽3—8厘米，无毛或背面被疏长柔毛；无柄或具短柄；叶舌长1.5—2厘米。总花梗长10—30厘米，被5—7枚鳞片状鞘；花序球果状，顶端钝，长6—15厘米，宽3.5—5厘米；苞片覆瓦状排列，紧密，近圆形，长2—3.5厘米，初时淡绿色，后变红色，边缘膜质，被小柔毛，内常贮有粘液；花萼长1.2—2厘米，膜质，一侧开裂；花冠管长2—3厘米，纤细，裂片披针形，淡黄色，后方的一枚长，长1.5—2.5厘米；唇瓣淡黄色，中央裂片近圆形或近倒卵形，长1.5—2厘米，宽约1.5厘米，顶端2裂，侧裂片倒卵形，长约1厘米；雄蕊长1厘米，药隔附属体喙状，长8毫米。蒴果椭圆形，长8—12毫米；种子黑色。花期：7—9月，果期：10月。

产广东、广西、云南等省区；生于林下荫湿处。亚洲热带地区广布。

根茎能祛风解毒，治肚痛、腹泻，并可提取芳香油作调合香精原料；嫩茎叶可当蔬菜。（见《广西植物名录》）

#### 4. 珊瑚姜（海南植物志） 图版50：7

*Zingiber corallinum* Hance in Journ. Bot. 18: 301. 1880, et 21: 357. 1883; K. Schum. in Engl. Pflanzenr. 20 (IV. 46): 180. 1904; 广东省植物研究所编, 海南植物志 4: 102. 1977.

株高近1米。叶片长圆状披针形或披针形，长20—30厘米，宽4—6厘米，叶面无毛，叶背及鞘上被疏柔毛或无毛；无柄；叶舌长2—4毫米。总花梗长15—20厘米，被紧接的、长4—5厘米的鳞片状鞘；穗状花序长圆形，长15—30厘米；苞片卵形，长3—4厘米，顶端急尖，红色；花萼长1.5—1.8厘米，沿一侧开裂几达中部；花冠管长2.5厘米，裂片具紫红色斑纹，长圆形，长1.5厘米，顶端渐尖，后方的一枚较宽；唇瓣中央裂片倒卵形，长1.5厘米，侧裂片长8毫米，顶端尖；花丝缺，花药长1厘米，药隔附属体喙状，长约5毫米，弯曲；子房被绢毛，长2—2.5毫米。种子黑色，光亮，假种皮白色，撕裂状。花期：5—8月；果期：8—10月。

产广东、广西；生于密林中。模式标本采自广东海南。

据记载，根茎能消肿，解毒。

#### 5. 毛姜（新拟）

*Zingiber kawagoii* Hayata, Ic. Pl. Formos. 10: 35. 1921.

株高30—60厘米。叶片长圆形或长圆状披针形，长20厘米，宽6厘米，两面均被极薄的短柔毛；叶柄极短；叶舌2裂，耳状。总花梗长4—5厘米，多花；苞片披针形，长2厘米，基部鞘状；萼管长1厘米，一侧开裂，顶端截平，基部被粗毛；花冠管纤细，长2—3厘米，裂片3，紫色，长2厘米，后方的一枚宽9毫米，内凹，两侧的较狭；唇瓣倒卵形，暗紫蓝色，长2.2厘米，宽2厘米，中裂片顶端微凹，侧裂片较小；花药近圆柱形，长1厘米，药隔附属体线形，长1厘米，弯曲。

产我国台湾。模式标本采自台湾。

#### 6. 多穗姜(新拟)

**Zingiber pleiostachyum** K. Schum. in Engl. Pflanzenr. 20 (IV. 46): 185. 1904.

纤细草本，株高50厘米。叶片长圆形或长圆状披针形，长9—15厘米，宽3—4.5厘米，两面均无毛；叶柄长3—6毫米；叶舌2裂，长6毫米，无毛。花序很多，总花梗长4—7厘米，呈“之”字形，无毛，上有5—6枚长圆状披针形的鞘；穗状花序有花4—6朵；苞片线状披针形，长3厘米，无毛；小苞片旋卷；花红色，有长6—7毫米、被绢毛的小花梗；花萼长1.8厘米，一侧开裂；花冠管极纤细，长3.8厘米，裂片长约2厘米；唇瓣近菱形，长约2.4厘米，侧裂片长6毫米，稍锐尖；花药与药隔附属体各长1.1厘米。

产我国台湾。模式标本采自台湾。

据原著者称，本种苞片极狭，花有被绢毛的小花梗，极易与近缘种区别。

#### 7. 红冠姜(新拟)

**Zingiber roseum** (Roxb.) Rosc. in Trans. Linn. Soc. 8: 348. 1807; Bak. in Hook. f., Fl. Brit. Ind. 6: 244. 1892; K. Schum. in Engl. Pflanzenr. 20 (IV. 46): 184. 1904.—*Amomum roseum* Roxb., Corom., Pl. t. 126. 1798.

株高达1.5米。叶片长圆形或长圆状披针形，长约30厘米，宽3—5厘米，叶面无毛，叶背被长柔毛，无柄；叶舌膜质，2裂，长达3.5厘米。总花梗极短，穗状花序稠密，头状，长达6厘米；苞片红色，外面的阔卵形，里面的卵状披针形，长3.5—4.5厘米；花萼绿色，长1.5厘米；花冠管白色，长2厘米，裂片披针形，淡红色；唇瓣长圆状楔形，略较花冠裂片为短，白色，边缘卷曲、皱褶；侧裂片极短，圆形，黄色；雄蕊弯拱形，药隔附属体与花药等长。花期：秋。

产云南西南部(德宏自治州)；生于疏林中潮湿之处，海拔940米。印度也有分布。

本种叶舌极长，很容易和近缘种区别开来。

#### 8. 匙苞姜(植物分类学报)

**Zingiber cochleariforme** D. Fang, 植物分类学报 18: 225. 1980.

根茎肥厚，块状，淡黄色，具辛辣味，常有块根。株高0.7—2米；叶片椭圆状披针形，稀近长圆形，长35—48厘米，宽8—14厘米，顶端渐尖，基部楔形至圆楔形，叶面无毛，密被紫褐色腺点，叶背疏被贴伏的长柔毛和腺点；无柄或具长4—6毫米的短柄，被长柔毛；叶舌2深裂至2全裂，长4—7(14)毫米，膜质，无毛或被疏毛。穗状花序卵形至倒卵形，长3—6厘米，宽1.5—5厘米；总花梗长1—6厘米，柔弱，被长柔毛；苞片紫色或白色，楔状匙形至长圆形，顶端截平或圆形，长1.5—4厘米，宽0.5—2厘米，外被柔毛；小苞片一侧开裂至基部，长2.2—2.8厘米；花无梗；花萼淡黄色，长1—1.3厘米，一侧浅裂；花冠管长3.5—4厘米，裂片披针形，黄白色，长约2.5厘米，宽约5毫米；唇瓣黄白色，长约